

2009年考研西医综合辅导讲义同步练习109考研 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/564/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_80\\_83\\_c73\\_564526.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/564/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_80_83_c73_564526.htm) 第30章骨与关节化脓性感染 一

、A型题：在每小题给出的A、B、C、D四个选项中。只有一项是最符合题目要求的。

828．急性血源性骨髓炎的最常见致病菌是 A．溶血性金黄色葡萄球菌 B．乙型溶血性链球菌 C．嗜血流感杆菌 D．大肠杆菌

829．急性血源性骨髓炎的病理特点是 A．死骨及死腔形成 B．骨膜下脓肿形成 C．以骨质破坏、坏死为主 D．骨质破坏、坏死和反应性骨质增生同时存在

830．血源性骨髓炎时“骨性包壳”来源于 A．骨质钙化 B．肉芽组织钙化 C．大片死骨 D．骨膜反应形成的新骨

831．急性血源性骨髓炎的好发部位是 A．肱骨、尺桡骨 B．尺桡骨 C．胫骨、股骨 D．胫腓骨

832．对确诊早期急性血源性骨髓炎最有价值的检查方法是 A．血细菌培养 B．局部分层穿刺 C．核素显像 D．CT检查

833．患儿，6岁。寒战高热伴右小腿疼痛2天入院。查体：体温39.5，精神差，右胫骨近端有压痛，局部皮肤红肿。诊断性穿刺于骨膜下抽得少许淡红色脓液。化验：血白细胞 $20 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.91。X线摄片见右胫骨近端软组织肿胀。本例最可能的诊断为 A．软组织化脓性感染 B．右胫骨结核 C．右胫骨化脓性骨髓炎 D．右膝关节化脓性炎

834．急性血源性骨髓炎经抗生素治疗一周后，全身及局部症状消失，下一步的治疗为 A．开窗减压 B．软组织切开减压 C．石膏托固定2个月 D．继续使用抗生素3~6周

835．急性骨髓炎，在骨膜下抽得少量脓液，最关键的治疗措施是 A．联合使用大量敏感抗生素 B．作细菌培养，根据

药敏试验结果调整抗生素 C . 病灶清除术 D . 钻孔引流 836 . 急性血源性骨髓炎转变为慢性阶段的主要原因是 A . 细菌毒力太低 B . 细菌毒力太高 C . 机体抵抗力太低 D . 治疗不及时、不彻底 837 . 化脓性关节炎好发于 A . 肘关节 B . 肩关节 C . 腕关节 D . 髌、膝关节 838 . 化脓性关节炎最早出现的X线骨骼改变是 A . 骨质坏死 B . 骨质虫蚀状破坏 C . 骨质疏松 D . 关节软骨破坏 839 . 急性血源性骨髓炎和化脓性关节炎的鉴别要点不包括 A . 疼痛部位在关节 B . 早期出现关节腔积液 C . 全身中毒症状严重 D . 穿刺抽液检查

二、B型题：每小题只能从中选择1个最符合题目要求的。每个选项可以被选择一次或多次。 A . 类风湿关节炎 B . 膝关节化脓性关节炎 C . 膝关节滑膜结核 D . 膝关节全关节结核 840 . 关节穿刺注药治疗无效时行切开引流 841 . 关节穿刺注药治疗无效时行病灶清除滑膜切除 A . 合理有效使用抗生素 B . 关节腔持续灌洗 C . 经关节镜灌洗 D . 关节切开引流 关节腔持续灌洗 842 . 早期治疗膝关节化脓性关节炎的最好方法是 843 . 早期治疗髌关节化脓性关节炎的最好方法是

三、X型题：A、B、C、D四个选项中至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案。 844 . 急性骨髓炎手术治疗的目的是 A . 引流脓液 B . 阻止急性骨髓炎转变为慢性 C . 清除死骨 D . 清除窦道 845 . 慢性骨髓炎手术治疗的原理是 A . 清除死骨 B . 清除炎性肉芽组织 C . 消灭死腔 D . 清除窦道 846 . 慢性骨髓炎手术时机的选择是 A . 有包壳生成者 B . 有死骨形成者 C . 有死腔形成者 D . 有窦道流脓者 847 . 慢性骨髓炎的手术方法包括 A . 楔形截骨术 B . 碟形手术 C . 带蒂肌瓣填塞术 D . 关节离断术 848 . 化脓性关节炎细菌进入关节内的途径包括 A . 血源性 B

· 邻近病灶直接蔓延 C . 关节手术后感染 D . 开放性损伤发生感染 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)