

第二十章 第五节 解热镇痛药的复方配伍药师资格考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/565/2021\\_2022\\_\\_E7\\_AC\\_AC\\_E4\\_BA\\_8C\\_E5\\_8D\\_81\\_E7\\_c23\\_565233.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/565/2021_2022__E7_AC_AC_E4_BA_8C_E5_8D_81_E7_c23_565233.htm) 一些常用解热镇痛

药常相互配伍，或配伍巴比妥类、咖啡因或抗组胺药（如氯苯那敏）以期提高疗效和减少不良反应。但据一些对照观察，复方并不优于单用，且复方中大多含有非那西丁（苯胺类），久用可致肾乳头坏死，并可能引起肾盂癌；非那西丁还可能与某些复方久用引起依赖性有关。此外，不少复方都含氨基比林（吡唑酮类），少数患者服用后出现粒细胞缺乏。

因此，对这些复方需重新评价；对含氨基比林的复方应慎用。

表20-1 常用复方解热镇痛药成分名称 成分与含量（g/片）

用法	乙酰水杨酸	非那西丁	氨基*比林	安替*比林	咖啡因	苯巴比妥
巴比妥	0.22	0.15	0.035			
复方阿司匹林片（APC）	0.22	0.15	0.035			
1~2片/次，3次/日						
复方氯苯那敏片	0.2268	0.162	0.0324	0.002	1	
1~2片/次，3次/日						
氨啡咖片	0.15	0.1	0.03			
1~2片/次，3次/日						
去痛片	0.15	0.15	0.05	0.015		
1~2片/次，3次/日						
安痛定注射液（2ml）	0.1	0.04	0.18			
皮下或肌注，一次2ml						

\*为吡唑酮类解热镇痛药。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)