

第二十二章 第四节 快速型心律失常的药物选用

药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/565/2021_2022__E7_AC_AC_E4_BA_8C_E5_8D_81_E4_c23_565249.htm 选用抗心律失常药

物应考虑多种因素，包括心律失常的类别，病情的紧迫性，患者的心功能及医师对各个药物的了解及应用经验等。药物治疗最满意的效果是恢复并维持窦性节律，其次是减少或取消异位节律，再次是控制心室频率，维持一定的循环功能。

各种快速型心律失常的选药如下：1.窦性心动过速 应针对病因进行治疗，需要时选用 受体阻断药，也可选用维拉帕米。

2.心房纤颤或扑动转律用奎尼丁（宜先给强心甙），或与普萘洛尔合用，预防复发可加用或单用胺碘酮，控制心室频率用强心甙或加用维拉帕米或普萘洛尔。

3.房性早搏必要时选用普萘洛尔，维拉帕米，胺碘酮，次选奎尼丁，普鲁卡因胺，丙吡胺。

4.阵发性室上性心动过速除先用兴奋迷走神经的方法外，可选用维拉帕米、普萘洛尔、胺碘酮、奎尼丁、普罗帕酮。

5.室性早搏必要时首选普鲁卡因胺、丙吡胺、美西律、妥卡尼、胺碘酮，急性心肌梗塞时宜用利多卡因，强心甙中毒者用苯妥英钠。

6.阵发室性心动过速选用利多卡因、普鲁卡因胺、丙吡胺、美西律、妥卡尼等。

7.室纤颤选利多卡因、普鲁卡因胺（可心腔内注射）。表22-1 常用抗心律失常药应用比较

心律失常	奎尼丁	丙吡胺	利多卡因	苯妥英钠	氟卡尼	普萘洛尔	胺碘酮	维拉帕米
房颤，转律	2	1	0	0	1	2	1	1
预防	3	3	0	0	0	2	0	2
控制室率	0	0	0	0	0	2	0	3
阵发室上性心动过速	2	2	0	1	3	2	4	2
房性早搏	3	3	0	1	0	3	2	2
室性早搏	3	3	4	2	2	1	2	2
室性心动过速	3	2	3	2	2	1	1	1
强心甙中毒时的各种心律失常	1	1	3	3	0	2	0	0

*根据各药的效价，不良反应及应用方便等作出比较 0=不用
；1=差；2=可；3=良；4=优 更多信息请访问：执业药师网校
百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏
特别推荐：2009年药师资格考试报名时间汇总"#F8F8F8"
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com