

地氟醚（全身麻醉药）药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/572/2021_2022__E5_9C_B0_E6_B0_9F_E9_86_9A_EF_c23_572523.htm 其他名称：优宁
主要成分：性状：吸入剂。功能主治：成人全麻的诱导和维持，小儿全麻的维持。用法及用量：诱导：常用起始浓度为3%，每隔2-3次呼吸增加0.5-1%的浓度，吸入4-11%的优宁，2—4分钟可以产生外科麻醉。维持同氧化亚氮混合，吸入2-6%的浓度可维持在外科麻醉期水平，而同氧气或空气氧气混合吸入，则需2.8-8.5%的浓度，在小儿用或不用氧化亚氮，浓度需达5.2-10%，才能维持外科麻醉期水平。慢性肝肾功能损害或肾移植病人用氧化亚氮／氧混合吸入，优宁的浓度为1-4%。不良反应和注意：可以引起剂量依赖性血压下降和呼吸抑制，麻醉诱导时可出现咳嗽、屏气、分泌物增多、呼吸暂停和喉痉挛。术后可有恶心和呕吐。本药麻醉可以触发骨骼肌代谢亢进，导致氧耗增加，引起恶性高热。其它：已知对氟类吸入麻醉药敏感者，已知或者怀疑恶性高热的遗传易感者，以前用过氟类麻醉药后发生肝功能不良、不明原因的发热和白细胞增多者禁用。更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 特别推荐：2009年药师资格考试报名时间汇总"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com