

注射用两性霉素B的注意事项药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/572/2021_2022__E6_B3_A8_E5_B0_84_E7_94_A8_E4_c23_572529.htm 1.注射用两性霉素B毒性大，不良反应多见，但它又是治疗危重深部真菌感染的唯一有效药物，选用注射用两性霉素B时必须权衡利弊后作出决定。 2.下列情况应慎用：（1）肾功能损害，注射用两性霉素B主要在体内灭活，故肾功能重度减退时半衰期仅轻度延长，因此肾功能轻、中度损害的患者如病情需要仍可选用注射用两性霉素B，重度肾功能损害者则需延长给药间期或减量应用，应用其最小有效量；当治疗累积剂量大于4g时可引起不可逆性肾功能损害。（2）肝功能损害，注射用两性霉素B可致肝毒性，肝病患者避免应用注射用两性霉素B.3.治疗期间定期严密随访血、尿常规、肝、肾功能、血钾、心电图等，如血尿素氮或血肌酐明显升高时，则需减量或暂停治疗，直至肾功能恢复。 4.为减少注射用两性霉素B的不良反应，给药前可给解热镇痛药和抗组胺药，如吲哚美辛和异丙嗪等，同时给予琥珀酸氢化可的松25~50mg或地塞米松2~5mg一同静脉滴注。 5.注射用两性霉素B治疗如中断7日以上者，需重新自小剂量（0.25mg/kg）开始逐渐增加至所需量。 6.注射用两性霉素B宜缓慢避光滴注，每剂滴注时间至少6小时。 7.药液静脉滴注时应避免外漏，因注射用两性霉素B可致局部刺激。 更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 特别推荐：2009年药师资格考试报名时间汇总"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

