

巯咪唑（他巴唑Thiamazole, Tapazole）、卡比马唑（甲亢平）

[作用] 1、作用机制： 活性碘生成 (1) 抑制过氧化酶 - 碘化酪氨酸缩合 甲状腺素合成 甲状腺素合成 (2) 丙基硫氧嘧啶可抑制外周T4转为T3 (3) 抑制异常免疫反应，对甲亢病起一定治疗作用。 2、作用特点： (1) 生效缓慢，需待贮存激素用尽才见效 (1~3个月基础代谢恢复正常)。(2) 治疗后甲状腺充血、肿大、变软变脆及突眼加重，原因：负反馈减弱，TSH分泌增加； (3) 疗程长 (1~2年) 停药过早易复发。 [用途] 1、甲亢内科治疗：轻、中度或不宜手术、放碘治疗者。 2、甲亢术前准备及术后复发治疗：术前控制甲状腺机能接近正常，以利于手术，减少并发症和死亡率，但术前两周应加服碘。 3、辅助治疗甲状腺危象，阻断新甲状腺素合成，但剂量要大。可怀 受体断药合用，疗效更好。 [不良反应] 1、白细胞减少症：本类药最严重的不良反应，应定期查血象，如出现咽痛、发热应立即检查和停药，以甲基硫氧嘧啶和甲亢平为多见； 2、过敏反应：皮疹、严重者可致剥脱性皮炎需停药或采用糖皮质激素治疗； 3、头痛、关节痛、淋巴结肿大； 4、肝损害、黄疸。突眼明显或甲癌忌用。 5、能透过胎盘和乳汁排出，影响胎儿，新生儿，妊娠、哺乳妇女禁用。 [常用各药特点比较] 药物作用特点 甲基硫氧嘧啶 作用确定，起效较慢 丙基硫氧嘧啶 作用确定，起效快，甲危疗效好。他巴唑作用较上强10倍，起效亦较慢，但持久，甲危治疗不如丙基。甲亢平 作用缓慢、持久，甲危不宜用。 二、碘和碘化物 常用药有：碘化钾、卢戈氏液（复方碘溶液） [作用] 1、小剂量：甲状腺素合成原料之一。 2、大剂量： 抑制蛋白水解酶 甲状腺释放 亦可

抑制过氧化酶 碘化和碘化酪氨酸缩合下降 甲状腺素合成 ; 抑制TSH释放和对抗TSH对甲状腺的刺激作用,使用甲状腺缩小,变硬、血管减少。[应用] 1、单纯甲状腺肿:小剂量原料补充; 2、甲亢术前准备:术前两半周加服,缓解症状,减少手术并发症; 3、甲状腺危象治疗:抑制甲状腺素大量释放。[不良反应] 1、血管神经性水肿; 2、慢性碘中毒。3、诱发甲状腺功能紊乱。三、放射性碘:利用产生的射线破坏甲状腺组织,用于甲亢及甲状腺机能检查,注意控制剂量,过量致甲状腺功能低下。四、受体阻断药常用有普萘洛尔等。通过阻断受体,抑制甲亢所致交感过度兴奋而产生的症状和减少甲状腺素分泌。可用于甲亢治疗、甲危辅助治疗以及术前准备。 "#F8F8F8" 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com