骨折考试必记的九个考点实践技能考试 PDF转换可能丢失图 片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/585/2021\_2022\_\_E9\_AA\_A8\_ E6 8A 98 E8 80 83 E8 c22 585649.htm 骨折考试必记的九个 考点 以下内容为考试复习重点\*\*\*历年执业和助理都考,请大 家务必要熟悉。 1、肱骨外科颈为肱骨大结节、小结节移行 为肱骨干的交界部位,是松质骨和密质骨的交界处,位于解 部颈(肱骨头周围的环形沟)下2~3cm,有臂丛神经、腋血 管在内侧经过,因此骨折可合并神经、血管损伤。2、骨折 的局部表现:三大特有体征:畸形、反常活动、骨擦音或骨 擦感; 3、肱骨干骨折合并桡神经损伤时, 有垂腕、各手指 掌指关节不能伸直,拇指不能背伸以及手背桡侧皮肤有大小 不等的感觉麻木区。 4、肱骨髁上骨折最易损伤尺神经,尺 神经受伤后,除手部尺侧皮肤感觉消失外,环、小指掌指关 节过伸,指间关节屈曲呈爪形,表现为"爪形手":拇指不 能内收,其他四指不能外展及内收。 [ 医学教育网 搜集整理 15、肱骨髁上骨折偶可引起正中神经挤压性损伤,医学教 育网原创 骨折复位后往往能自行恢复。损伤后表现为"猿手 ":可出现拇、示、中指不能屈曲,拇指不能外展和对掌, 手掌桡侧三个半手指感觉障碍。 6、胫骨中上段的横切面是 三棱形,至下1/3呈四方形,两者移行交接处,骨的形态转变 ,是容易发生骨折的部位。 7、胫骨中下1/3交接处骨折时, 易发生骨折延迟愈合或不愈合。腓总神经于腓骨颈外侧走行 , 骨折易受损伤。 8、髋关节后脱位的典型表现:患肢缩短 ,髋关节呈屈曲,内收、内旋畸形;髋关节前脱位的典型表 现:髋关节呈屈曲,外展、外旋畸形;髋关节中心脱位的典

型表现:医学教育网原创患肢缩短情况由股骨头内陷的程度决定;由于后腹膜间隙内出血甚多,可以出现失血性休克。 9、断指(肢)再植原则上是越早越好,应分秒必争。一般常温以6~8小时为限。如伤后时间长,上臂和大腿断离,断指再植可延长至12~24小时。100Test下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com