

隐匿性肾小球肾炎应该做哪些检查临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/585/2021\\_2022\\_\\_E9\\_9A\\_90\\_E5\\_8C\\_BF\\_E6\\_80\\_A7\\_E8\\_c22\\_585662.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/585/2021_2022__E9_9A_90_E5_8C_BF_E6_80_A7_E8_c22_585662.htm) 本病尿异常改变的特点： 仅以少量蛋白尿为主，常称作“无症状性蛋白尿”。

反反复发血尿，患者平时尿检可无异常或仅有镜下血尿，无特殊症状及体征，在一定诱因（如发热、咽炎、劳累、受凉）影响下，经数小时或数天（多在1 - 2天），出现肉眼血尿，短期内（经1 - 4天）血尿消失或恢复到原来水平。如镜下血尿持续存在，相差显微镜检查尿红细胞为多形型，计数 > 10000/ml，无管型，可称“单纯性血尿”。24小时尿蛋白足量多在2g以下，以白蛋白为主。绝大多数镜下血尿，红细胞呈多形性、多样性。肾功能正常，类风湿因子及抗核抗体阴性，补体正常。同位素肾、肾脏B超及静脉肾盂造影正常。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)