

肺结核的早期症状临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/585/2021_2022__E8_82_BA_E7_BB_93_E6_A0_B8_E7_c22_585677.htm

任何疾病都强调早期诊断以便得到及时治疗。一般情况下肺结核常会出现一些症状，在了解肺结核的早期症状之前，先来了解一下肺结核的常见起病方式，大致有以下四种：1、慢性起病。主要为疲劳乏力、低热、消瘦等症状，容易被人忽视，以为是工作过度劳累等引起。2、急性起病。有中度发热或高热，咳嗽，咳少量痰，容易当作感冒或流行性感冒，但按感冒治疗两周以上仍未见效。3、以咯血起病。咯血量不等或痰血，咯血常引起病人注意，作胸透或胸片检查，进一步作痰结核菌检查而发现患肺结核。4、有病侧胸痛、发热、气急等自觉症状。检查发现胸膜炎，如胸腔积液则胸痛缓解。常见结核的早期症状有以下几种：1、疲劳易乏力以清晨及下午明显，但晚上可兴奋，有时烦躁失眠。2、体重减轻又找不出别的原因。3、胃纳减退，食而无味。4、慢性咳嗽或伴有咳痰，早晨干咳。5、出现痰中带血或咯血。6、午后潮热，下午或晚上低热，后半夜退尽，像潮水那样有涨有落。7、夜间盗汗并伴疲劳感，有时反复出现。8、胸痛、胸闷可伴有发热，有可能患胸膜炎。9、妇女出现月经不调如经量减少、延迟或闭经；男性病人尤其青年人易遗精。有以上症状者宜及时去医疗单位检查，如作胸透、胸片、痰找结核菌、结核菌素试验等，以便及早发现肺结核或肺外结核。但有的肺病人症状不明显，在体格检查或在检查其它疾病时发现已患肺结核。还应注意的是肺结核病人可发生肺外过敏表现，如眼的

泡疹性角膜炎结节性红斑、结核过敏性关节炎等，容易误诊。以上种种症状虽是肺结核的常见症状，但并不能单凭这些症状就说是结核病，而是不能忽视这些症状，应及早检查，明确是否患有肺结核。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com