

棉子中毒应该如何治疗临床执业医师考试 PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/585/2021\\_2022\\_\\_E6\\_A3\\_89\\_E5\\_AD\\_90\\_E4\\_B8\\_AD\\_E6\\_c22\\_585683.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/585/2021_2022__E6_A3_89_E5_AD_90_E4_B8_AD_E6_c22_585683.htm) 食入不久者当给催吐及洗胃并服泻剂，食入时间超过半天者应给高位洗肠，静脉输液，纠正脱水及电解质紊乱，病人易有低钾血症，应及时补钾，开始静脉滴注5~10天，以后口服维持量10~30天，对复发病例，需用维持量更久。在补钾过程中，应以心电图及血钾测定值作参考。可试用二巯基丙磺酸钠治疗，5%溶液0.1ml/kg，皮下或肌注，每日1次，3天为一个疗程，间隔3~7天再进行第2疗程。此外为对症治疗。更多信息请访问：  
百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师  
加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)