

执业药师辅导资料试题(一)与答案执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/586/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E8_8D_AF_E5_c23_586689.htm 工厂基础知识 一、

以下题每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 新斯的明用于去神经的骨骼肌和眼则出现 A. 肌肉松弛，瞳孔扩大 B. 肌肉松弛，瞳孔缩小 C. 肌肉兴奋，瞳孔缩小 D. 肌肉兴奋，瞳孔无变化 E. 肌肉和瞳孔均无变化 答案：D

2. 手术后肠麻痹常用 A. 毒扁豆碱 B. 新斯的明 C. 丙胺太林 D. 毛果芸香碱 E. 阿托品 答案：B

3. 某重症肌无力患者用新斯的明后，因过量出现腹痛、腹泻、流涎、出汗、瞳孔缩小、肌肉震颤和胆碱能危象。解救药应是 A. 阿托品 B. 新斯的明 C. 碘解磷定 D. 筒箭毒碱 E. 阿托品 碘解磷定 答案：E

4. 重症肌无力的对因治疗药 A. 糖皮质激素 B. 钙制剂 C. 新斯的明 D. 氯化钾 E. 地西泮 答案：A

5. 重症肌无力患者有呼吸抑制和缺氧者禁用药除外 A. 氨基糖苷类抗生素 B. 氯丙嗪 C. 吗啡 D. 地西泮 E. 氯仿 答案：B

6. 患者有轻度重症肌无力应选用哪种药为宜 A. 钙制剂 B. 新斯的明 C. 糖皮质激素 D. 氯化钾 E. 地西泮 答案：B

7. 患者，男，36岁，患轻度震颤麻痹，长期服用某药后肌僵直及运动迟缓的症状明显改善，但同时出现严重的消化道反应和体位性低血压。该病人服用的药物是 A. 左旋多巴 B. 金刚烷胺 C. 卡比多巴 D. 司来吉兰 E. 苯海索 答案：A

8. 左旋多巴治疗震颤麻痹的机制是 A. 促使多巴胺释放 B. 补充脑中多巴胺 C. 中枢抗胆碱作用 D. 抑制外周多巴脱羧

酶 E . 直接激动DA受体 答案 : B 9 . 金刚烷胺治疗震颤麻痹的作用机制除外 A . 直接激动DA受体 B . 抑制DA的再摄取 C . 促进多巴胺的释放 D . 抗胆碱作用 E . 在中枢转化为DA而起作用 答案 : E 10 . 下列哪种联合用药治疗震颤麻痹的方法是合理的最好的 A . 左旋多巴 维生素1 B . 左旋多巴 卡比多巴 C . 卡比多巴 维生素B6 D . 左旋多巴 维生素B6 卡比多巴 E . 多巴胺 苯海索 答案 : D 11 . 关于左旋多巴特点的叙述哪项是错误的 A . 疗效产生较慢 B . 对轻症效果好 C . 改善肌强直效果好 D . 缓解肌颤效果好 E . 运动迟缓效果好 答案 : D 12 . 服用左旋多巴治疗震颤麻痹为提高疗效可同服 A . 维生素B6 B . 氯丙嗪 C . 卡比多巴 D . 利血平 E . 单胺氧化酶A抑制剂药 答案 : C 13 . 患者 , 女 , 20岁 , 因患癫痫大发作长期服用某药癫痫得到很好控制 , 但出现精神行为异常和齿龈增生 , 此药是 A . 苯巴比妥 B . 卡马西平 C . 苯妥英钠 D . 扑痫灵 E . 丙戊酸钠 答案 : C 14 . 癫痫小发作的首选药是 A . 氯硝西洋 B . 丙戊酸钠 C . 乙琥胺 D . 卡马西平 E . 苯妥英钠 答案 : C 15 . 某患者 , 有癫痫小发作合并大发作应选用的药是 A . 苯巴比妥 B . 丙戊酸钠 C . 苯妥英钠 D . 卡马西平 E . 乙琥胺 答案 : B 16 . 对癫痫大发作 , 小发作 , 精神运动性发作均有效的药物是 A . 苯妥英钠 B . 苯巴比妥 C . 丙戊酸钠 D . 卡马西平 E . 乙琥胺 答案 : C 17 . 治疗三叉神经痛应首选 A . 去痛片 B . 安定 C . 阿司匹林 D . 卡马西平 E 苯妥英钠 答案 : D 18 . 治疗癫痫大发作或局限性发作 , 最有效的药物是 A . 安定 B . 乙琥胺 C . 苯妥英钠 D . 卡马西平 E . 丙戊酸钠 答案 : D 19 . 苯妥英钠不宜用于 A . 癫痫大发作 B . 癫痫持续状态 C . 癫痫小发作 D . 局限性发作 E . 精神运动性发作 答案 : C 20

· 属于阿片生物碱类药 A . 可待因 B . 哌替啶 C . 芬太尼 D . 美沙酮 E . 镇痛新 答案：A 21 . 吗啡产生强大镇痛作用的机理是 A . 选择性抑制痛觉中枢 B . 镇静并产生欣快感 C . 模拟内源性阿片肽的作用 D . 促进内源性阿片肽的作用 E . 降低痛觉感受器的敏感性 答案：C 22 . 下列哪项不是哌替啶的适应证 A . 创伤所引起的疼痛 B . 手术后疼痛 C . 晚期恶性肿瘤的疼痛 D . 分娩止痛 E . 神经痛 答案：E 23 . 吗啡用于其他镇痛药无效时的急性锐痛只是因为 A . 吗啡对于急性锐痛效力>对慢性钝痛的效力 B . 其成瘾性大 C . 吗啡治疗急性锐痛时，不产生副作用 D . 吗啡对急性锐痛有选择性作用 E . 达峰时间快，血药浓度高 答案：B 24 . 心源性哮喘可选用 A . 异丙肾上腺素 B . 阿托晶 C . 哌替啶 D . 肾上腺素 E . 地塞米松 答案：C 25 . 雷尼替丁按化学结构是哪一类的H₂受体拮抗剂 A . 咪唑 B . 呋喃 C . 噻唑 D . 吡啶 E . 哌嗪甲苯类 答案：B 26 . 被列为非麻醉性镇痛药的是 A . 哌替啶 B . 可待因 C . 镇痛新 D . 芬太尼 E . 美沙酮 答案：C 27 . 大剂量引起血压升高的镇痛药是 A . 吗啡 B . 镇痛新 C . 芬太尼 D . 哌替啶 E . 美沙酮 答案：B 28 . 属于水杨酸类的药物 A . 吲哚美辛 B . 醋氨酚 C . 保泰松 D . 布洛芬 E . 阿司匹林 答案：E 29 . 前列腺素合成酶抑制剂是 A . 美散痛 B . 氟哌啶醇 C . 阿司匹林 D . 氯丙嗪 E . 氢化可的松 答案：C 30 . 患者，男，20岁，癫痫持续状态，作为首选，地西洋的最佳的给药途径是 A . 静脉注射 B . 口服 C . 肌肉注射 D . 皮下注射 E . 静脉点滴 答案：A 31 . 能明显缩短快波睡眠的药物是 A . 苯巴比妥 B . 地西洋 C . 氯丙嗪 D . 水合氯醛 E . 利眠宁 答案：A 32 . 患者因腰肌劳损引起肌痉挛，临床上选用的中枢性骨骼肌松弛药是 A

· 普鲁卡因 B . 地西洋 C . 筒箭毒碱 D . 琥珀胆碱 E . 毒扁豆碱 答案 : B 33 . 地西洋不具备下列哪项作用 A . 抗焦虑作用 B . 镇静 , 催眠 C . 抗抑郁作用 D . 抗惊厥作用 E . 中枢性肌肉松弛作用 答案 : C 34 . 常用的抗惊厥药除外 A . 苯巴比妥 B . 水合氯醛 C . 异戊巴比妥 D . 地西洋 E . 口服硫酸镁 答案 : E 35 . 关于水合氯醛错误的叙述是 A . 催眠作用迅速 B . 不缩短快波睡眠时相 C . 大剂量有抗惊厥作用 D . 安全范围比巴比妥类大 E . 用于顽固性失眠 . 答案 : D 36 . 巴比妥类药物的用途哪项除外 A . 消除具有中枢兴奋作用药物所致的失眠 B . 小儿高热惊厥 C . 苯巴比妥常用于癫痫小发作 D . 麻醉和麻醉前给药 E . 苯巴比妥可用于高胆红素血症 答案 : C 37 . 地西洋的临床应用哪项除外 A . 治疗焦虑症 B . 治疗失眠症 C . 治疗癫痫 D . 夜惊和夜游症 E . 用于麻醉和麻醉前给药 答案 : E 38 . 吡格列酮是哪类结构的药物 A . 双胍类 B . 磺酰脲类 C . 噻唑烷二酮类 D . α -葡萄糖苷酶抑制剂 E . 氢氯噻嗪类药物 答案 : C 39 . 炔雌醇的乙醇溶液与硝酸银试液产生白色是由于分子中有 A . 羟基 B . 醇羟基 C . 乙炔基 D . 氟原子 E . 甲基酮 答案 : C 40 . 在合成唑类抗真菌药物的化学结构中 , 哪个基团是必需的 A . 分子中至少含有一个羟基 B . 分子中至少含有一个吡啶环 C . 分子中至少含有一个咪唑或三氮唑环 D . 分子中至少含有一个吡环 E . 分子中至少含有一个哌嗪环 答案 : C 41 . 氯丙嗪抗精神病作用机理是 A . 阻断中脑-边缘系统通路和结节-漏斗通道的DA受体 B . 阻断中脑-边缘系统通路和中脑-皮质通路的DA受体 C . 阻断中脑-皮质通路和黑质-纹状体通路的DA受体 D . 阻断结节-漏斗通路和黑质-纹状体通路的DA受体 E . 中脑-边缘系统和黑质-纹状体通

路的DA受体 答案：B 42. 有癫痫史的精神分裂症患者的禁用
药 A. 氟哌啶醇 B. 三氟拉嗪 C. 氯丙嗪 D. 舒必利 E. 五氟
利多 答案：C 43. 下列哪种情况下降温作用最 A. 氯丙嗪十
阿司匹林 B. 氯丙嗪 哌替啶 C. 氯丙嗪 异丙嗪 D. 氯丙嗪 物
理降温 E. 氯丙嗪 地塞米松 答案：D 100Test 下载频道开通，
各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com