

股骨头坏死有哪些致病因素？临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/589/2021\\_2022\\_\\_E8\\_82\\_A1\\_E9\\_AA\\_A8\\_E5\\_A4\\_B4\\_E5\\_c22\\_589367.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/589/2021_2022__E8_82_A1_E9_AA_A8_E5_A4_B4_E5_c22_589367.htm) 引起股骨头坏死的因素很多，大概有40多种。归纳起来分创伤性和非创伤性。创伤性有考试，大收集整理股骨颈骨折、髋关节脱位或髋臼骨折、髋关节长期慢性累积性损伤等。非创伤性包括：药源性股骨头坏死，如激素治疗；酒精性股骨头坏死，病人长期大量饮酒，酒精中毒而致；有些疾病也可合并股骨头坏死，如：骨质疏松、结缔组织病、白血病，糖尿病、镰状细胞病、柯兴氏病、粘多糖病、减压病、红斑狼疮等；另外，髋关节先天性发育不良，骨内应力和骨外应力变化，也能导致股骨头坏死。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)