

中医伤科学：肱骨干骨折的病因病理中医执业医师称考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/593/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E5\\_8C\\_BB\\_E4\\_BC\\_A4\\_E7\\_c22\\_593247.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/593/2021_2022__E4_B8_AD_E5_8C_BB_E4_BC_A4_E7_c22_593247.htm)

一、病因 1. 直接暴力：如棍棒打击。常见于中上1/3，多为粉碎型或横断。 2. 间接扭转暴力：如投掷、掰腕子所致。常见于下1/3，多为斜形或螺旋形。 二、病理 1. 肱骨干上1/3骨折（三角肌止点以上）：骨折近段因胸大肌、背阔肌和大圆肌的牵拉而向内向前；骨折远段因三角肌的牵拉而向上向外。 2. 肱骨干中1/3骨折：骨折位于三角肌抵止部以下时，骨折近考：试大网站收集段因三角肌和喙肱肌的收缩向外向前；骨折远段因肱二、三头肌的收缩而向上移位。 3. 肱骨干下1/3骨折：骨折移位多因暴力方向、前臂和肘关节的位置而异，伤后患者常将前臂贴附于胸壁前，造成骨折远段的内旋。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)