

产力异常的临床表现及诊断、预防临床执业医师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/593/2021_2022__E4_BA_A7_E5_8A_9B_E5_BC_82_E5_c22_593303.htm

1.临床表现及诊断 临床常见的产程进展异常，有以下4种类型：（1）潜伏期延长。临产开始至宫口扩张3cm为潜伏期，正常约需8小时，如 > 16小时为潜伏期延长。（2）活跃期延长或延缓。子宫颈口扩张3cm至宫口开全为活跃期。正常4~8小时，如 > 8小时为活跃期延长；宫口扩张的进展每小时 < 1cm，即为活跃期延缓。（3）活跃期停滞。分娩进入活跃期后，子宫颈口扩张的考，试大收集整理进程达2小时以上无进展者称为活跃期停滞。（4）第二产程延长或停滞。初产妇第二产程 > 2小时，经产妇 > 1小时为第二产程延长，第二产程 > 1小时而胎头下降无进展为第二产程停滞。2.预防 加强妊娠期保健，积极治疗营养不良及慢性疾病，及时发现和纠正胎位不正。加强产时监护，消除思想顾虑和恐惧心理，关心产妇休息、饮食、大小便，避免过多使用镇静药物，及时发现和处理难产因素。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com