

甲状舌管囊肿与鳃裂囊肿有哪些表现及如何诊断口腔执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/593/2021_2022__E7_94_B2_E7_8A_B6_E8_88_8C_E7_c22_593372.htm

1.肿物表面光滑、质软、界清，较大者有波动感。 2.甲状舌管囊肿主要位于颈部正中舌骨上下，有一索条与舌骨相连，肿物可随吞咽上下移动。 3.鳃裂囊肿通常位于颈侧中份舌骨平面，胸锁乳突肌上1/3深面和前缘。 4.穿刺可抽出黄色或棕黄色液体。「临床表现」

1.甲状舌管囊肿与鳃裂囊肿皆为出现在颈部或面侧的隆起性考试，大收集整理软性肿块，前者较小（约蚕豆大小），

发生在舌骨水平的颈中线，能随吞咽上下活动；后者常较大（约鸡蛋大小）多见于颈侧部的动脉三角区，常有波动感。

2.甲状舌管囊肿多见于儿童，易感染而有疼痛感，也有以瘘管形式表现者，即位于舌骨水平皮肤上见一小口，常流出少量清亮液体。

3.鳃裂囊肿多见于青少年，由于上呼吸道感染可突然肿大疼痛，可因来源于第一、二、三、四不同的鳃裂而有肿块位置的上下改变。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com