

口腔颌面外科学综合测试卷一及答案口腔执业医师考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/593/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8F\\_A3\\_E8\\_85\\_94\\_E9\\_A2\\_8C\\_E9\\_c22\\_593400.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/593/2021_2022__E5_8F_A3_E8_85_94_E9_A2_8C_E9_c22_593400.htm)

- 一、单项选择题：（每题1分，共30分）
- 1.对颌下腺及舌下腺的扪诊常采用：A.双手双合诊法 B.双指双合诊法 C.三指平触诊 D.单指扪诊 E.双指提拉式扪诊 【答案】A
- 2.眶下神经阻滞麻醉口外注射法进针点是：A.眶下缘中点下方0.5~1cm B.眶下缘内侧下方0.5~1cm C.眶下缘外侧下方0.5~1cm D.同侧鼻翼旁约1cm E.同侧鼻翼旁约2cm 【答案】D
- 3.拔牙的禁忌症不包括：A.充血性心力衰竭患者 B.一年前发生过心肌梗死患者 C.不稳定心绞痛 D.恶性肿瘤范围内的牙 E.有Ⅱ度房室传导阻滞的患者 【答案】B
- 4.关于妊娠妇女拔牙哪项是正确的：A.妊娠第1、2、3个月期间可以拔牙 B.妊娠第4、5、6个月期间可以拔牙 C.妊娠第7、8、9个月期间百考试题收集整理可以拔牙 D.拔牙对妊娠妇女无影响 E.妊娠期间禁忌拔牙 【答案】B
- 5.安放拔牙钳时，错误的方法是：A.钳喙应于牙长轴平行 B.钳喙应置于牙冠釉质上并与之紧贴 C.安放时钳喙应沿颊腭侧插入 D.安放好牙钳后应再次核对牙位 E.正确选用拔牙钳 【答案】B
- 6.牙拔除后3~4天，出现拔牙创剧烈疼痛，最可能是：A.干槽症 B.牙槽突骨折 C.牙龈损伤 D.牙槽窝内有异物 E.过高骨嵴和骨尖 【答案】A
- 7.某患者，女性，21岁，昨日拔右下颌第一磨牙后拔牙创出血不止，检查见拔牙创舌侧牙龈撕裂约1cm，局部渗血明显。正确止血方法为：A.棉纱球压迫止血 B.填塞碘仿纱条 C.行颈外动脉结扎术 D.肌注止血敏 E.局麻下缝合牙龈裂口 【答案】E
- 8.某患者，女性，28岁，左上乳百考试题收集整理

滞留乳牙不松动，X线显示左上3横位埋伏阻生24牙根之间，左上乳 牙根无吸收。此时最佳处理方法是：A.拔除左上乳 ，完整拔除左上3移植于拔牙窝内 B.拔除左上乳 及左上3种植修复 C.拔除左上乳 活动修复 D.拔除左上乳 ，左上3开窗牵引助萌 E.保留左上乳 观察【答案】E

9.下列哪个部位的骨折最容易引起呼吸道阻塞：A.颈部正中骨折 B.一侧颞孔区骨折 C.双侧颞孔区骨折 D.下颌角骨折 E.髁状突骨折【答案】C

10.口腔颌面部挫伤形成较大血肿时，应进行以下哪一项处理：A.尽早进行热敷。促进血肿的吸收或消散 B.尽早进行理疗。促进血肿的吸收或消散 C.早期切开，建立引流，应用抗菌药物预防感染 D.无菌条件下，用粗针头将血液抽出，然后加压包扎，应用抗菌药物 E.直接加压包扎，然后应用抗菌药物预防感染【答案】D

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)