

氟罗沙星片的不良反应临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/593/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B0\\_9F\\_E7\\_BD\\_97\\_E6\\_B2\\_99\\_E6\\_c22\\_593433.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/593/2021_2022__E6_B0_9F_E7_BD_97_E6_B2_99_E6_c22_593433.htm)

1.胃肠道反应较为常见，可表现为腹部不适或疼痛、腹泻、恶心呕吐、食欲不振等。2.中枢神经系统反应可有头昏、头痛、兴奋、嗜睡或失眠。3.过敏反应有皮疹、皮肤瘙痒，偶可发生渗出性多形性红斑及血管神经性水肿。少数患者有光敏反应。4.少数患者可发生血氨基转移酶、血尿素氮增高及周围血考，试大收集整理象白细胞降低，多属轻度，并呈一过性。5.偶可发生：

(1) 癫痫发作、精神异常、烦躁不安、意识混乱、幻觉、震颤；(2) 血尿、发热、皮疹等间质性肾炎表现；(3) 结晶尿，多见于高剂量应用时；(4) 关节疼痛。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)