

六甲嘧胺（抗肿瘤药物）临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/593/2021_2022__E5_85_AD_E7_94_B2_E5_98_A7_E8_c22_593442.htm

其他名称：六甲三聚氰胺 性状：片剂。 功能主治：1.主要用于治疗肺癌，尤其对小细胞型未分化癌效果较好，与甲氨喋呤并用可提高完全缓解率。2.对恶性淋巴瘤、卵巢癌、乳腺癌、头颈部癌及消化系统癌有效。3.可用于治疗慢性粒细胞白血病，疗效与白消安相似，且比较安全。 用法及用量：口服：一般为每日每千克体重10-12mg，分4次服，21日为1疗程；或每日每千克体重8mg，90日为1疗程。在饭后1-1.5小时服药，大收集整理能减少胃肠道反应。治疗慢性白血病，从每日200mg开始，3日后逐步递增至每日800mg，连续服药至缓解或无效为止。缓解后，可减量维持。 不良反应和注意：1.胃肠道反应有恶心、呕吐，但一般不严重。2.骨髓抑制：主要使白细胞下降，偶有血小板下降。3.神经系统毒性：长期服用对中枢及周围神经系统有一定影响。4.偶有皮疹、皮炎等。5.其他不良反应有麻木、感觉异常、抑郁、精神错乱、昏睡和幻觉。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com