

磷酸甲基吗啡（镇痛药）临床执业医师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/593/2021_2022__E7_A3_B7_E9_85_B8_E7_94_B2_E5_c22_593445.htm 性状：片剂、注射液、糖浆剂。功能主治：用于治疗剧烈干咳和中等度的疼痛，对胸膜炎干咳并伴有胸痛者尤为适用。可待因片为世考，大收集整理界卫生组织（WHO）癌症三阶梯中度疼痛止痛推荐用药。与阿司匹林合用，可增强止痛效果。用法及用量：口服：每次15-30mg，每日3次；糖浆剂：每次3-6ml；极量：每次100mg，每日250mg。儿童：镇痛：每（kg.次）1mg，每日3次；止咳：每（kg.次）0.3-0.5mg，每日3次。皮下注射：每次15-30mg，每日30-90mg；儿童镇痛：每（kg.次）0.5-1mg。不良反应和注意：剂量加大（60mg以上）易发生兴奋、烦躁不安。规格：片剂：15mg、30mg；针剂：15mg / 1ml、30mg / 1ml；糖浆剂：0.5%。其它：成瘾性、呼吸抑制、便秘等较吗啡轻，但久用仍可成瘾，且与吗啡有交叉耐受性；有少量痰液的患者宜与祛痰药合用。痰多者及1岁以下婴儿忌用。本品属麻醉药品管理。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com