

巯嘌呤（抗肿瘤药物）临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/593/2021_2022__E5_B7_AF_E5_98_8C_E5_91_A4_EF_c22_593448.htm 其他名称：6-MP6-巯基嘌呤NSC-755乐疾宁巯基嘌呤

主要成分：性状：片剂。功能主治：用于急性白血病效果较好，对慢性粒细胞白血病也有效；用于绒毛膜上皮癌，试大收集整理癌和恶性葡萄胎。

另外对恶性淋巴瘤、多发性骨髓瘤也有一定疗效。用法及用量：

1.白血病：口服：每日每千克体重1.5-3mg，分2-3次服。

根据血象改变调整剂量，显效时间2-4周，1疗程2-4个月。

2.绒毛膜上皮癌：口服：每日每千克体重6mg，连用10日为1疗程。

隔3-4周后可再重复疗程。不良反应和注意：1.胃肠道反

应有：食欲减退、恶心、呕吐、腹泻、口腔炎、口腔溃疡

。2.骨髓抑制：白细胞和血小板下降，严重者可有全血象抑

制。3.少数病人有肝功能损害，可出现黄疸；敏感病人可有

血尿酸过高、尿酸结晶尿及肾功能障碍。100Test 下载频道开

通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com