

利血宝（抗贫血药）临床执业医师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/593/2021_2022__E5_88_A9_E8_A1_80_E5_AE_9D_EF_c22_593449.htm

主要成分：利血宝。
性状：注射液。功能主治：施行血液透析时之肾性贫血。
用法及用量：在用药初期，通常对成人给予每次3,000国际单位之Epoetinalfa，每周三次的缓慢地静脉注射。待贫血情况改善后，将剂量改为1,500国际单位每周两至三次，或者3,000国际单位一星期两次的维持治疗。以血红蛋白浓度约10g / dl（红细胞比容值30%），作为贫血症状改善与否之指标。剂量需视贫血症的严重程度，病人年龄及考试，大收集整理其他相关因素而调整维持剂量，但最高不可超过每星期三次，每次2,000国际单位。不良反应和注意：主要的副作用是血压上升，高血压及高血压恶化125例（4.8%），头痛34例（1.3%）其他副作用包括搔痒、关节痛、分流闭塞、血栓、发烧、热感、恶心、呕吐、倦怠感。其它：注意事项：
1.须遵照医师的处方指示使用。2.本剂为医师处方用药品。
3.应避免冻结及光照射，请保存于摄氏10 以下。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com