

临床执业医师 硫酸庆大霉素临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/593/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_593453.htm 其他名称：小儿利宝正泰霉素 主要成分：氨基糖甙类抗生素。 性状：片剂、注射液、颗粒剂。 功能主治：主要用于大肠杆菌、痢疾杆菌、克酶白肺炎杆菌、变形杆菌、绿脓杆菌等革兰阴性菌引起的系统或局部感染。 用法及用量：1.肌注：1次每千克体重1.5mg（或每次80mg），每8小时1次。对于革兰阴性菌所考，试大收集整理致重症感染或绿脓菌全身感染，1日量每千克体重可用到5mg.静脉滴注给药可将1次量（80mg），用100ml液体稀释，于30分钟左右滴入，1日给药3次。新生儿每千克体重1日2-4mg，分2次给予。2.口服：每日240-640mg，儿童1日量每千克体重为15mg，分4次服，用于肠道感染或术前准备。 其它：1.对于肾功能不全者或长期用药者应进行药物监测。2.本品1日量宜分2~3次给药，以维持有效血药浓度，并减轻毒性反应。不要把1日量集中在1次给予。3.毒性反应与卡那霉素近似，因剂量小，故毒性反应稍轻。但若用量过大或疗程延长，仍可发生耳、肾损害，应予注意。4.对链球菌感染无效。由链球菌引起的上呼吸道感染不应使用。5.有抑制呼吸作用，不可静脉推注。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com