

造成产后出血的主要原因临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/593/2021\\_2022\\_\\_E9\\_80\\_A0\\_E6\\_88\\_90\\_E4\\_BA\\_A7\\_E5\\_c22\\_593454.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/593/2021_2022__E9_80_A0_E6_88_90_E4_BA_A7_E5_c22_593454.htm)

(1) 子宫下段横切口两端叨断子宫动脉向下斜行分支，造成局部供血不足。术中止血不良，形成局部血肿或局合感染组织坏死。致使切口不愈合。(2) 横切口选择过低或过高： 过低，宫须侧以结缔组织为主。血供较差，组织愈合能力差，且靠近阴道，增加感染机会。 过高，切口上缘宫体肌组织与切口下缘子宫下段肌组织厚薄相差大，缝合时不易对齐。愈合不良。

(3) 缝合技术不当：组织对位不仕；手术操作粗暴；出血血管缝扎不紧；切口两侧角部考，试大收集整理未将回缩血管缝扎形成血肿：缝扎组织过多过密，切口血循环供应不良等，切口均可愈合不良。以上因素均可在肠线溶解脱落后，血窦重新开放，多发生在术后23周，出现大量阴道流血，甚至引起休克。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)