

新生儿低钙血症有哪些表现及如何诊断临床执业医师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/593/2021_2022__E6_96_B0_E7_94_9F_E5_84_BF_E4_c22_593556.htm

症状及诊断：1、母孕期可能有糖尿病或妊娠高血压，早产儿及有窒息史者多见。2、多于生后数小时至2日发病，有不安、惊跳、肢体震颤、喉痉挛、惊厥等。发作间期小儿一般状况良好。3、血钙低于 3.5mmol/L (7mg/dl) 或游离钙低于 1.75mmol/L (3.5mg/dl)。早期低血钙常在出生72小时内出现，见于早产儿、低体重儿，各种难产儿、患颅内出血、窒息、rds、败血症、酸中毒用碱性液后及母患糖尿病、妊高症和甲状旁腺功能亢进者。早产儿无症状低钙血症考试，大收集整理常可自然缓解，但仍需口服葡萄糖酸钙。晚期低血钙是指生后72小时至3周末发生的低血钙，多为足月儿。与人工喂养，牛乳中含磷比例高影响钙的吸收有关。此型低钙血症不论足月儿还是早产儿都可能出现手足搐搦。症状轻重不一，主要表现为不安、惊跳、震颤和惊厥，偶而出现喉痉挛和呼吸暂停。发作新时期小儿一般情况良好，但肌张力稍高，腱反射增强。正常新生儿的击面神经试验（佛斯特征）呈阳性反应，故无诊断意义。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com