

肾上腺皮质功能减退症应该做哪些检查？临床执业医师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/593/2021_2022__E8_82_BE_E4_B8_8A_E8_85_BA_E7_c22_593766.htm

一、一般检查：血像检查有轻度正细胞正色素性贫血，淋巴细胞及嗜酸粒细胞偏高。血生化检查，部分病人血清钠偏低，血清钾偏高。血糖偏低，约1/3病例低于正常范围。葡萄糖耐量试验呈低平曲线或反应性低血糖，心电图低电压和T波低平或倒置，Q~T时间可延长。X线检查，可见心影缩小，呈垂直位。

二、特殊检查（一）尿17羟皮质类固醇（17OHCS）和17酮皮质类固醇（17KS）排出量低于正常。其减低程度与肾上腺皮质呈功能平行关系。（二）血浆皮质醇测定，多明显降低，而且昼夜节律消失。（三）ACTH兴奋试验：此试验为检查肾上腺皮质的功能贮备。可发现轻型慢性肾上腺皮质功能减退症患者及鉴别原发性慢性肾上腺皮质功能减退与继发性慢性肾上腺皮质功能减退。三、血浆ACTH基础值测定：原发性肾上腺皮质功能减退者明显增高，多超过55pmol/L（250pg/ml），常介于88~440pmol/L（400-200pg/ml）之间（正常值1.1~11pmol/L即5~50pg/ml）而继发性肾上腺皮质功能减退者血浆ACTH浓度极低。四、病因检查：结核性者在肾上腺区X光片中可能看肾上腺内的钙化灶也可能有其他组织和器官的结核病灶。在自身免疫性肾上腺皮质破坏的患者血清中可能测到肾上腺皮质抗体，病人经常伴有其他自身免疫性疾病及内分泌腺功能低下。转移性肾上腺癌肿患者，可能发现原发性癌灶。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏 100Test 下

载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com