

可摘局部义齿的Kratochvil分类口腔执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/593/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8F\\_AF\\_E6\\_91\\_98\\_E5\\_B1\\_80\\_E9\\_c22\\_593826.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/593/2021_2022__E5_8F_AF_E6_91_98_E5_B1_80_E9_c22_593826.htm) Kratoehvil分类是根据可摘局部义齿的支持形式，即是牙支持还是牙与黏膜共同支持可划分成两类。第一类 牙支持可摘局部义齿，即力主要由余留天然牙承担。第二类 游离端可摘局部义齿，即力主要由余留天然牙和黏膜及骨组织共同承担。 Kratoehvil分类是在牙列缺损固定化修复的大趋势下产生的。由于大部分缺牙少的非游离端牙列缺损已行固定义齿修复，因而可摘局部义齿主要用于缺牙多的非游离端和游离端缺损，这种分类的第一类义齿实际上就是Kennedy第三类牙列缺损的义齿设计，即非游离端可摘局部义齿，而Kratohvil分类的第二类义齿实际上就是Kennedy第一、二、四类牙列缺损的义齿设计，即游离端义齿设计，包括单侧后牙、双侧后牙和前牙游离端可摘局部义齿。Kratochvil义齿分类的核心是强调义齿支持组织的差异，强调应按不同的支持形式来设计义齿。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)