

肾及输尿管重复畸形应该如何治疗临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/593/2021\\_2022\\_\\_E8\\_82\\_BE\\_E5\\_8F\\_8A\\_E8\\_BE\\_93\\_E5\\_c22\\_593870.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/593/2021_2022__E8_82_BE_E5_8F_8A_E8_BE_93_E5_c22_593870.htm) 1.对于上述第一情况，不须任何特殊治疗。 2.对于第二种情况，由于有明显的合并症，则行上段肾（有合并症的肾段）切除。此种手术由于它有各自的血液供给，切除时远较一般肾部分切除易于处理。 3.对于第三种情况，如其有合并症，则按上述，于腰部行肾段切除术；如无合并症，仅是尿失禁问题，则于下腹部手术，将异常之输尿管移位于膀胱内亦可。 更多信息请访问：[百考试题医师网校](#) [医师论坛](#) [医师在线题库](#) [百考试题执业医师](#) [加入收藏](#) [100Test](#) [下载频道](#) [开通](#)，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)