

轮状病毒所致胃肠炎有哪些表现及如何诊断临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/594/2021_2022__E8_BD_AE

[_E7_8A_B6_E7_97_85_E6_c22_594092.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/594/2021_2022__E8_BD_AE_E7_8A_B6_E7_97_85_E6_c22_594092.htm) (一) 普通轮状病毒胃肠炎 潜伏期1~3天。病情差别较大，6~24月龄小儿症状重，而较大儿童或成年人多为轻型或亚临床感染。起病急，多先吐后泻，伴轻、中度发热。腹泻每日十到数十次不等，大便多为水样，或呈黄绿色稀便，常伴轻或中度脱水及代谢性中毒。部分病例在出现消化道症状前常有上呼吸道感染症状。本病为自限性疾病，病程约1周左右。(二) 成人腹泻轮状病毒胃肠炎 潜伏期2~3天，起病急，多无发热或仅有低热，以腹泻、腹痛、腹胀为主要症状。腹泻每日3~10次不等，为黄水样或米汤样便，无脓血。部分病例伴恶心、呕吐等症状。病程3~6天，偶可长达10天以上。更多信息请访问：[百考试题医师网校](#) [医师论坛](#) [医师在线题库](#) [百考试题执业医师](#) [加入收藏](#) [100Test](#) [下载频道](#) [开通](#)，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com