

联合瓣膜病变应该如何治疗临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/594/2021\\_2022\\_\\_E8\\_81\\_94\\_E5\\_90\\_88\\_E7\\_93\\_A3\\_E8\\_c22\\_594099.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/594/2021_2022__E8_81_94_E5_90_88_E7_93_A3_E8_c22_594099.htm) 「治疗原则」 1、强心、利尿、调整心功能。有心衰可用强心、利尿、扩血管药物治疗，地高辛0.125mg，1~2/d，硝普钠25~50mg，加入250ml液体中，VD，6滴/分左右，双氢克尿噻25mg，1~3/d，注意补钾。重者可用西地兰0.2~0.4mg，iv，速尿20~60mg，iv. 2、体外循环下行双瓣膜置换术或瓣膜成形。「用药原则」 1、体外循环时，必用肝素并据病情需要应用抑太酶和人体白蛋白。 2、术前术后应用抗生素防止感染。 3、术后据病情使用抗心律失常药物及强心利尿药物。 4、术后华法林或新抗凝片服用终身。 更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)