

肾上腺素中毒应该如何治疗？临床执业医师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/594/2021_2022__E8_82_BE_E4_B8_8A_E8_85_BA_E7_c22_594454.htm 出现中毒症状，立即停药。注射过量时，立即于注射部位上方暂时结扎止血带，以延缓药物吸收。血压过高时，可选用速效的血管扩张药物如亚硝酸异戊酯吸入或硝酸甘油片舌下含化；或酌用酚苄明 $0.5 \sim 1\text{mg/kg}$ ，加于 5% 葡萄糖液 $250 \sim 500\text{ml}$ 中静脉滴注。亦可先用酚妥拉明，继用冬眠灵维持降压效果。血压中度增高而心率快时，可用利血平。如有心室颤动，应迅速进行药物除颤或电击除颤；效果不佳时，可用人工心脏起搏器。如有去甲肾上腺素局部外漏或早期坏死，可用 $0.5\% \sim 1\%$ 普鲁卡因溶液 $5 \sim 10\text{ml}$ 在坏死处上部或渗漏处周围作局部封闭；亦可用妥拉苏林 $10 \sim 25\text{mg}$ 或酚妥拉明 5mg 溶于 1% 普鲁卡因或生理盐水 $10 \sim 20\text{ml}$ 内作局部封闭，若加入透明质酸酶 $1000 \sim 1500\text{u}$ ，效果更好。同时保护创面使不受感染。更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com