

内科学测试题及答案肝脏疾病（二）临床执业医师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/594/2021_2022__E5_86_85_E7_A7_91_E5_AD_A6_E6_c22_594469.htm

65、对肝硬化诊断最有价值的是【E】 A、脾肿大 B、B超肝内回声粗糙不匀 C、肝掌，蜘蛛痣 D、肝功能试验异常 E、钡透食管下端有蚯蚓状充盈缺损 66、肝硬化时肝功能减退的表现是【B】 A、 γ 球蛋白增加，男性乳房发育，腹壁静脉曲张 B、清蛋白比例倒置，雌激素增多，ICG试验潴留 C、血小板减少，食管静脉曲张，蜘蛛痣 D、胆固醇降低，血胆红素增加，脾肿大 E、转氨酶增高，透明质酸酶增加，腹水 67、肝昏迷患者经治疗后神志恢复可给予蛋白质饮食，最适宜的选择是【C】 A、肉类蛋白质 B、牛乳蛋白 C、植物蛋白 D、碳水化合物 E、蛋白质在40克/天以上 68、关于肝性脑病的治疗下述哪项是错误的【D】 A、禁止蛋白质饮食的摄入 B、躁动不安时禁用吗啡类药物 C、口服甲硝唑 D、肥皂水灌肠 E、给予支链氨基酸 69、症状出现之前肝性脑病的早期检测方法是【C】 A、血氨 B、脑电图 C、诱发电位 D、空腹血糖 E、肝功能 70、对亚临床肝脑病最有诊断价值的是【D】 A、视觉诱发电位 B、躯体诱发电位 C、脑电图 D、简易智力测验 E、血氨 71、肝昏迷前期最突出的表现是【E】 A、表情欣快，昼睡夜醒 B、精神错乱 C、肌张力增高 D、行为异常、吐词不清 E、意识模糊、扑翼震颤 72、肝性脑病的处理，无效的措施是【D】 A、用弱酸液洗肠 B、中止蛋白质饮食 C、口服新霉素 D、静脉滴入多巴胺 E、静脉滴注精氨酸 73、肝性昏迷患者出

现抽搐时最好选用【D】 A、氯丙嗪 B、吗啡 C、副醛 D、地西泮（安定） E、硫喷妥钠

74、48岁，肝硬化病史5年，大量放腹水后出现睡眠障碍，扑翼样震颤，脑电异常最可能的诊断是【B】 A、肝性脑病Ⅰ期 B、肝性脑病Ⅱ期 C、肝性脑病Ⅲ期 D、肝性脑病Ⅳ期 E、亚临床肝性脑病

75、男性，38岁，肝硬化病史2年，高蛋白饮食后出现睡眠障碍，计算力障碍，脑电异常，下列治疗措施哪种不合适【C】 A、限制蛋白饮食 B、弱酸性溶液灌肠 C、弱碱性溶液灌肠 D、乳果糖口服 E、精氨酸滴注

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com