

公共卫生执业医师资格考试流行病学练习题十一实践技能考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/601/2021\\_2022\\_\\_E5\\_85\\_AC\\_E5\\_85\\_B1\\_E5\\_8D\\_AB\\_E7\\_c22\\_601763.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/601/2021_2022__E5_85_AC_E5_85_B1_E5_8D_AB_E7_c22_601763.htm)

某城市1996年1月1日至1996年12月31日采用抽样调查方法，了解城市及郊区脑卒中发病和死亡情况，共调查2018724人，其中城市人口1050292人。发现病例共2416例，死亡1722例，其中城市病例1588例，死亡1033例。请回答：1. 城市与郊区的脑卒中患病率？（列出计算公式，不做具体计算）

城市脑卒中患病率=2416/1050292，农村脑卒中患病率=(2416-1588)/(2018724-1050292)

2. 该市脑卒中对城市和郊区两个地区危害哪个更为严重？（列出依据的指标计算公式，不做具体计算，指出是否有特点）

城市脑卒中患病率=1588/1050292，城市脑卒中死亡率=1033/1050292 农村脑卒中患病率=(2416-1588)/(2018724-1050292) 农村脑卒中死亡率=(1722-1033)/(2018724-1050292)

1998年农村结核病患病率=800/50000；3. 绘制合适的表格表示该市脑卒中的患病情况。（画出统计表的草表框架，不一定精确）

用条图表示

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)