

外用藥木鱉子中西醫助理醫師稱考試 PDF 轉換可能丟失圖片或格式，建議閱讀原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/604/2021_2022__E5_A4_96_E7_94_A8_E8_8D_AF_E2_c22_604545.htm

【別名】木蟹（《綱目》），土木鱉（《醫宗金鑑》），壳木鱉（《藥材資料彙編》），漏苓子（《中藥志》），地桐子、藤桐子（《中藥材手冊》），鴨屎瓜子（《藥材學》），木鱉瓜（廣州空軍（《常用中草藥手冊》））。【英文】【拉丁

】SemenMomordicaeCochinchinensis【商品名】木鱉子【處方名】木鱉子【性味】味苦、微甘，性溫，有毒。【歸經】歸肝、脾、胃經。【功效】消腫散結，解毒，追風止痛。【考證】木鱉子，《日華子》始載，《開寶本草》云：“藤生，葉有五花，狀如薯蕷葉，青色，面光，花黃，其子似栝樓而極大，生青熟紅，肉上有刺，其核似鱉，故以為名”。其後，《本草圖經》、《綱目》對其形態亦有類同描述，並云：“……每一實其（‘其’當為‘有’）核三四十枚，八月，九月採，嶺南人取嫩實及苗葉作茹餐食之。”以上所述皆為本種。【藥源】為葫蘆科植物木鱉子Momordicacochinchinensis（Lour.

）Spreng.的種子。【形態】多年生粗壯大藤本，長達15m.具板狀根。全株近無毛和稍被短柔毛。卷須較粗壯，光滑無毛，不分歧。葉柄粗壯，長5~10m，初時被黃褐色柔毛，後近無毛，在基部和中部有2~4個腺體：葉片卵狀心形或寬卵狀圓形，質較硬，長寬均為10~20cm，3~5中裂至深裂或不分裂，葉脈掌狀。雌雄異株；雄花單生于葉腋或有时3~4朵着生在極短的總狀花序梗軸上，花梗粗壯，近無毛，單生時，花梗長6~12cm，頂端有1大苞片，苞片無梗，兜狀，圓腎形

，两面被短柔毛，花萼筒漏斗状，裂片宽披针形或长圆形，花冠黄色，裂片卵状长圆形，密被长柔毛，基部有齿状黄色腺体，外面2枚稍大，内面3枚较小，基部有黑斑。雄蕊3，2枚2室，1枚1室；雌花单生于叶腋，花梗长5~10cm，近中部生1苞片，苞片兜状，长宽均为2mm，花冠花萼同雄花，子房卵状长圆形，长约1cm，密生刺状毛。果实卵球形，先端有1短喙，基部近圆形；长达12~15cm，成熟时红色，肉质，密生3~4mm的刺状突起。种子多数，卵形或方形，干后黑褐色，长26~35mm，宽20~38mm，厚5~6mm，边缘有齿，两面稍拱起，具雕纹。花期6~8月，果期8~10月。常生于海拔450~1100m的山沟、林缘和路旁。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、广东、广西、湖南、四川、贵州、云南和西藏。【产地】南方大部分地区均有生产，主产于湖北、广西及四川等地。销全国各地。【采收】冬初采集果实，沤烂果肉；洗净种子，晒干备用。【炮制】1.木鳖子《理伤续断秘方》："去壳，细切。"现行；取原药材，除去杂质，筛去灰屑。用时去壳取仁，捣碎。2.木鳖子霜《朱氏集验方》："去壳纸捶出油。"《瑞竹堂经验方》："去皮油，为末。"现行，取净木鳖子，去壳取仁，炒熟，碾末，用草纸包裹数层，外加麻布包紧，压榨去油，反复多次，至草纸不再现油迹，色由黄变灰白色，呈现松散状时，研细。3.炒木鳖子《博济方》："炒焦。"《儒门事亲》："干炒。"《普济方》："去壳，炒熟。"现行，取净木鳖子，去壳取仁，用清炒法炒至青烟散尽，白烟初起为度，取出放凉。用时捣碎。4.砂炒木鳖子取净木鳖子，投入油制热砂内，用文火加热，炒至老黄色，取出，筛去河砂，放凉，研细。5.煨木鳖子取净木材灰炒热

，加入净木鳖子，用慢火（100~150℃）加热，适当翻动，至外壳干裂有响声，外皮呈焦黄色时，取出，筛去灰，去硬壳取仁，放凉，捣碎。贮干燥容器内，木鳖子霜、炒木鳖子。砂炒木鳖子。煨木鳖子，密闭，置阴凉干燥处。【商品情况】【药材特征】种子呈扁平圆板状或略三角状，两侧多少不对称，中间稍隆起或微凹下，长2~4cm，宽1.5~3.5cm，厚约5mm。表面灰棕色至棕黑色，粗糙，有凹陷的网状花纹或仅有细皱纹。周边有十数个排列不规则的粗齿，有时波状，种脐端稍窄缩，端处近长方形。外壳质硬而脆，内种皮甚薄，其内为2片肥大子叶，黄白色，富油质。有特殊的油腻气，味苦。以饱满、外壳无破裂，种仁色黄白者为佳。饮片性状：木鳖子霜为白色或类白色的松散粉末状，味苦。炒木鳖子为扁平圆板状，表面焦黑色，有油腻气，味苦微涩。砂炒木鳖子为淡黄色粗末状，有油腻气，味苦。煨木鳖子为淡黄色碎块，有油腻气，味苦。【应用】主治痈肿，疔毒，无名肿毒，痔疮，癣疮，粉刺，（黑干）（黑曾），乳痈，瘰疬，痢疾、风湿痹痛，筋脉拘挛，牙龈肿痛。【用量】0.60-1.20g【禁忌】孕妇及体虚者禁服。【附方】1.治一切痈疽肿毒，收赤晕木鳖子去壳、半夏各一两，小粉四两，草乌半两。上于铁铤内，慢火炒令焦，为细末，出火苗，再碾细，以冷水调敷，一日一换。（《济生方》乌龙膏）2.治两耳卒肿热痛木鳖子仁一两研如膏，赤小豆末半两，川大黄末五钱。上件药，同研令匀，水、生油旋调涂之。（《圣惠方》）3.治小儿丹瘤木鳖子（新者，去壳）。上研如泥，淡醋调敷之，一日三五次。（《外科精义》）4.治痔疮荆芥、木鳖子、朴硝各等分。上煎汤，入于瓶内，熏后，汤温洗之。5，治肠风

泻血用木鳖子不拘多少，桑柴烧过，微存性，使用磁器收之，候冷碾为末。每服一钱，用煨葱白酒调下，空心服。（4~5方出自《普济方》）6.治阴疝偏坠痛甚木鳖子一个磨醋，调黄柏、芙蓉末敷之。（《寿域神方》）7.治诸癣川槿皮、剪草、木鳖子各等分。上为细末，用醋调，涂之即愈。（《直指方》）8.治倒睫拳毛，风痒，赤烂木鳖子仁捶烂，以丝帛包作条，左患塞右鼻，右患塞左鼻；次服蝉蜕药为妙。（《孙天仁集验方》）9.治赤鼻，面疮，粉刺木鳖子（去壳）、大枫子（去壳）、轻粉、硫黄为末，以唾津调搽。（《仁术便览》）10.治小儿久患疳疾，体虚不食，及诸病后天柱骨倒，谓之五软木鳖子六个（去壳），蓖麻子六十个（去壳）。上为细末，先抱起颅，摩颈上令热，先用生山药捣汁，和药二味调贴之。（《奇效良方》生筋散）11.治脚气肿痛，肾脏风气，攻注下部疮痒甘遂半两，木鳖子仁四个。为末，猪腰子一个，去皮膜，切片，同药四钱掺在内，湿纸包煨熟，空心食之，米饮下。服后便伸两足，大便行后，吃白粥二三日。（《本事方》）12.治疔母木鳖子、穿山甲（炮）等分。为末，每服三钱，空心温酒下。（《医方摘要》）13.治痞癬木鳖多用（去壳），独蒜半钱，雄黄半钱。上杵为膏，入醋少许，蜡纸贴患处。（《得效方》木鳖膏）14.治经络受风寒邪气，筋脉牵连皮肤，疼痛结聚成核，拘挛麻痹木鳖子一两（去皮），锉如小豆大，用清油二两，浸一二宿，然后慢火熬及一半以来，取出木鳖子，下黄蜡一钱，相搅匀，等蜡化为度，绢滤去滓，乳香一钱（别研细，等木鳖子油与蜡相次欲凝，急投在油内，不住手搅匀）。上以磁器收，每用少许擦肌肉皮肤疼痛聚硬处，不住手，以极热为度。（《百一选

方》木鳖子膏) 15.治打扑损伤，瘀血不散疼痛木鳖子(去壳研)半两，桂(去粗皮)三分，芸薹子(酒浸研)二合，丁香五十粒。上四味，将丁香、桂为末，与研者二味和匀，次用生姜汁煮米粥摊纸上，将药末量多少掺入粥内，看冷热裹之，一日一换。(《圣济总录》木鳖裹方) 16.治风牙疼痛用木鳖子去壳，磨稀，调上患处。(《普济方》) 【文献】 【医论】 1.木鳖子为散血热，除痈毒之药 缪希雍："木鳖子味甘气温无毒。味厚于气，可升可降，阳也，为散血热、除痈毒之要药。夫结肿恶疮，粉刺(黑干)(黑曾)，肛门肿痛，妇人乳痈等证，皆血热所致。折伤则血亦瘀而发热。甘温能通行经络，则血热散，血热散则诸证无不瘳矣。其止腰痛者，盖指湿热客于下部所致，而非肾虚为病之比也，用者详之。"(《本草经疏》) 赵其光："苦温而甘，故能通达阴阳，流行经络之血郁壅热，消一切痈肿、折伤、瘰疬、乳痈、痔疮肛肿，止腰痛、疝积、痞块，追毒生肌，起倒睫拳毛，并一切寒湿郁热而为痛风、瘫痪、行痹、痿厥、脚气挛症、鹤膝，皆筋脉骨节，血不流行之病。"(《本草求原》) 2.论木鳖子有大毒，不可妄服 张景岳："木鳖子，有大毒，本草言其甘温无毒，谬也。今见毒狗者，能毙之于顷刻，使非大毒而有如是乎？人若食之，则中寒发噤，不可解救。若其功用，则惟以醋磨，用敷肿毒乳痈，痔漏肿痛及喉痹肿痛，用此醋漱于喉间，引痰吐出，以解热毒，不可咽下。或同朱砂、艾叶卷筒熏疥，杀虫最效。或用熬麻油，擦癣亦佳。"(《本草正》) 更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com