

口腔内科学学习题及答案（A1型题4）口腔执业医师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/604/2021_2022__E5_8F_A3_E8_85_94_E5_86_85_E7_c22_604731.htm

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 第一恒磨牙萌出特点中哪项不正确 A. 萌出最早，家长不认识 B. 牙龈缘位置稳定不发生改变 C. 釉质耐酸性低 D. 远中咬合面可长时间被牙龈覆盖容易发炎 E. 初萌时牙根未发育完成 正确答案：B

2. 第一恒磨牙龋蚀特征中哪项是错误的 A. 下颌患龋率高于上颌 B. 邻面比牙合面易患龋 C. 龋蚀进行速度快 D. 萌出时就可患龋 E. 乳牙患龋率高恒牙容易患龋 正确答案：B

3. 吮指不良习惯中哪项是错误的 A. 吮拇指发生率较高 B. 2岁以前多为生理性吸吮 C. 所吮手指不同对咬合的影响不同 D. 吮指习惯随年龄增长减少 E. 吸吮拇指可引起反合 正确答案：E

4. 下列乳牙龋病特点中哪项是错误的 A. 发病率高，发病时间早，多发 B. 容易发展成牙髓炎 C. 容易发生环状龋 D. 不能形成修复性牙本质 E. 自觉症状不明显，易忽略 正确答案：D

5. 乳磨牙制备银汞充填洞型时，哪项不正确 A. 合面窝沟龋局限时可制备独立圆形洞形，不必扩展 B. 单面洞邻壁过薄可制备 类洞形 C. 为避免意外穿髓不必强调底平 D. 洞要有一定深度，线角要圆钝 E. 乳牙不用恢复咬合高度和接触点 正确答案：E

来源：考试大

6. 乳磨牙邻面龋备洞时，哪项是错误的 A. 鸠尾岬宽度是颊舌尖间距离的1/3 B. 轴壁应与水平面垂直 C. 轴髓壁与合髓壁的线角应圆钝 D. 龈壁应水平 E. 龋蚀接近合面

时可不做台阶 正确答案：B 7. 预成冠的缺点是 A. 预成冠可以恢复牙齿解剖形态 B. 可以恢复咀嚼功能 C. 牙颈部不容易密合 D. 釉质发育不全、外伤牙可用预成冠修复 E. 预成冠可做间隙保持器的固位体 正确答案：C 8. 复合树脂修复乳前牙缺损时，哪个步骤是错误的 A. 去净腐质氧化锌丁香油糊剂垫底 B. 40%磷酸酸蚀90秒 C. 用水冲洗，吹干牙面30秒 D. 涂布薄层粘结剂，3秒后吹干 E. 分层放置复合树脂材料恢复外形 正确答案：A 9. 下列哪项不是乳牙牙髓炎特点 A. 上下乳磨牙好发 B. 炎症扩展迅速 C. 去腐未净露髓表明牙髓有慢性炎症 D. 牙髓感染可导致根分歧处骨吸收 E. 牙髓炎可伴有根吸收 正确答案：A 10. 乳牙牙髓治疗中哪项是正确的 A. 乳牙根管充填可用糊剂加牙胶尖 B. 牙髓坏疽可以做活髓切断 C. 牙根开始吸收时不能做活髓切断 D. 乳牙不能做氢氧化钙活髓切断 E. 乳牙保存活髓也很重要 正确答案：E 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com