

卫生学模拟试题（一）及答案口腔助理执业医师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/606/2021_2022__E5_8D_AB_E7_94_9F_E5_AD_A6_E6_c22_606406.htm A1型题]

以下每一考题下面有A、B、C、D、E 5个备选答案，请从中选一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

1. 医学统计的研究内容是 A. 研究样本 B. 研究个体 C. 研究变量之间的相关关系 D. 研究总体 E. 研究资料或信息的收集、整理和分析
2. 总体应该由 A. 研究对象组成 B. 研究变量组成 C. 研究目的而定 D. 同质个体组成 E. 个体组成
3. 在统计学中，参数的含义是 A. 变量 B. 参与研究的数目 C. 研究样本的统计指标 D. 总体的统计指标 E. 与统计研究有关的变量
4. 计算相对数的目的是 A. 为了进行显著性检验 B. 为了表示绝对水平 C. 为了便于比较 D. 为了表示实际水平 E. 为了表示相对水平
5. 相对数使用时要注意以下几点，其中哪一项是不正确的 A. 比较时应做假设检验 B. 离散程度和变异程度 C. 不要把构成比当率分析 D. 二者之间的可比性 E. 分母不宜过小
6. 抽样误差的定义为 A. 总体参数与总体参数间的差异 B. 个体值与样本统计量间的差异 C. 总体参数间的差异 D. 样本统计量与总体统计量间的差异 E. 样本统计量之间的差异
7. 在统计学中，定性因素是指 A. 定性指标 B. 计量资料 C. 计数资料 D. 等级资料 E. 变量
8. 抽样误差是指 A. 总体参数与总体参数间的差异 B. 个体值与样本统计量间的差异 C. 总体参数间的差异 D. 样本统计量与总体统计量间的差异 E. 以上都不对
9. 做频数表时，以组距为5，下列哪项组段划分正确 A. 0—，5—，10—，... B

. 05, 5—10, 10—, ... C. —5, —10, —15, ... D. 04, 59, 10—, ... E. 5—, 7—, 9—, ... 10. 用变异系数比较变异性程度适用于 A. 相同指标, 均数相差较大 B. 不同指标, 均数相差较小 C. 不同指标, 均数相差较大 D. 相同指标, 标准差相差较大 E. 以上均不是 11. 中位数与四分位数间距适用于 A. 正态分布资料 B. 偏态分布资料 C. 正偏态资料 D. 负偏态资料 E. 对称分布资料 12. 均数与标准差之间的关系是 A. 标准差越小, 均数代表性越大 B. 标准差越小, 均数代表性越小 C. 均数越大, 标准差越小 D. 均数越大, 标准差越大 E. 标准差越大, 均数代表性越大 13. 正态分布是以 A. t值为中心的频数分布 B. 参数为中心的频数分布 C. 变量为中心的频数分布 D. 观察例数为中心的频数分布 E. 均数为中心的频数分布 14. t值的分布 A. 正偏态分布 B. 负偏态分布 C. 近似正态分布 D. 正态分布 E. 偏态分布 15. 变异系数表示 A. 变异数 B. 对称分布 C. 集中趋势 D. 相对变异 E. 平均水平

100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。

详细请访问 www.100test.com