

溃疡_全身_症状库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/608/2021_2022__E6_BA_83_E7_96_A1__E5_85_A8_c22_608788.htm

溃疡概述：溃疡为真皮或皮肤深层组织的破坏所致的缺损愈后有疤痕此点与糜烂不同溃疡为继发损害凡是皮肤损伤感染或结节破溃达一定深度的损害可导致溃疡的发生
溃疡病因：皮肤溃疡一般是由外伤微生物感染肿瘤循环障碍和神经功能障碍免疫功能异常或先天皮肤缺损等引起的局限性皮肤组织缺损
外伤性溃疡往往是由物理和化学因素直接作用于组织引起微生物感染性疾病多由细菌真菌螺旋体病毒等引起组织破坏
结节或肿瘤破溃免疫异常引起的血管炎性溃疡系因动脉或小动脉炎使组织发生坏死而形成循环或神经功能障碍属营养障碍引起组织坏死如静脉曲张麻风溃疡等

(一) 细菌性疾病 脓疱肿痈蜂窝织炎汗腺炎皮肤结核疔疮皮肤炭疽鼻疽皮肤白喉坏死性痤疮下疳型脓皮病麻风热带溃疡分枝杆菌性溃疡游泳池肉芽肿口腔结核性溃疡

(二) 真菌性疾病 孢子丝菌病皮肤隐球菌病组织胞浆菌病球孢子菌病曲霉病足菌肿放线菌病奴卡菌病黄癣脓癣皮肤毛霉菌病

(三) 病毒性疾病 手足口病口蹄疫

(四) 寄生虫病 皮肤阿米巴病皮肤蝇蛆病

(五) 性传播疾病 生殖器疱疹梅毒软下疳鱼口肉芽肿性病性淋巴肉芽肿病

(六) 变应性皮肤病 固定性药疹

(七) 血管炎及血管性疾病 结节性多动脉炎变应性血管炎血栓闭塞性脉管炎丘疹坏死性结核疹硬红斑坏疽性脓皮病致死性中线肉芽肿wegener肉芽肿闭塞性动脉硬化症淤滞性皮炎雷诺症

(八) 物理性疾病 射线皮炎冻疮褥疮

(九) 职业性皮肤病 铬镍钠锌钴盐酸硫酸氢氟酸氢氧化钠碳酸钠

均可引起皮肤溃疡（十）自身免疫疾病 白塞病（十一）肿瘤
湿疹样癌 外阴癌 基底细胞癌 鳞癌 恶性黑色素瘤 皮脂腺癌 疣状肉芽肿 恶性组织细胞增生症 上kaposi肉瘤 毛鞘癌 纤维肉瘤 增殖性红斑 疣状癌 多发性浆细胞瘤（十二）其他 连续性肢端皮炎 结节性脂肪坏死 脂肪肉芽肿 足穿通性溃疡 阿弗他口腔炎 坏疽性龟头炎 急性女阴溃疡

溃疡诊断：（一）病史 了解溃疡患者的病史应针对溃疡发生的病因一般来讲应包括患者年龄性别职业及有无不洁性交史等因溃疡往往为继发损害因此在现病史中了解皮损最初损害的特点尤其重要常能提供诊断线索还应了解皮损部位发展快慢变化情况病期及用药情况既往疾病情况等（二）体格检查 体格检查应注意患者全身状况及溃疡的发生部位分布大小数目颜色边缘清楚与否形状基底及表面分泌物等情况（三）实验室检查 组织病理是常用的诊断方法对肿瘤血管炎及一般炎性溃疡可进行鉴别细菌培养真菌检查有助于感染性疾病的诊断详见鉴别诊断内容

溃疡鉴别诊断：一细菌性疾病 1．皮肤疔肿 疔肿系由葡萄球菌引起的深毛囊炎和毛囊周围炎 疔为数个疔互相融合成炎性肿块 蜂窝织炎由金黄色葡萄球菌溶血性链球菌引起广泛的皮肤皮下组织化脓性感染以上三种感染的炎性肿块可化脓破溃后形成溃疡 细菌培养有致病菌生长均有红用热痛等炎症特征一般不难与溃疡区别 2．汗腺炎 为发生于大汗腺部位的感染 女胜多见 主要发生于腋窝 外生殖器 腹股沟和肛门周围 炎性硬结破后排脓形成溃疡 愈后结疤 3．膨疮 常以链球菌感染为主 不清洁外伤虫咬为诱因 主要发生于小腿处 初起为炎性水疮或脓疮 向外围及深处发展 渗出物多可形成脓壳样厚痂 痂下为溃疡 境界清楚 圆形或椭圆形的溃疡 周边陡峭 基底较硬 附有

灰绿色脓性分泌物一般2 - 4周结疤而愈数月可定数个数十个不等久治不愈者可形成深在性坏死性溃疡 4 . 寻常狼疮 为皮肤结核最常见的类型儿童和青年多见常见于面部初为小结节质软苹果酱色可自行破溃形成溃疡愈后形成萎缩性瘢痕其周可出现新的皮损不痒不痛病程慢性病理示典型的结核结节 5 . 疼痛性皮肤结核 多发生于儿童青年女性多见为皮肤下方的淋巴结骨及关节的结核病灶经淋巴蔓延至皮肤而发病多先有淋巴结核以颈部上胸多见其次为腋腹股沟初为皮肤结节质硬增多粘连融合成块出现干酪样坏死软化破溃形成瘻管及溃疡病理示结核样结节 6 . 麻风溃疡 麻风患者神经功能障碍所引起的营养性溃疡一般好发于足底足跟四肢关节附近溃疡呈穿凿状无痛基底暗红肉芽陈旧不易出血表面有腐败坏死组织常伴有周围浅神经粗大皮肤干燥无汗脱发感觉障碍等病程慢性极难愈合可借助查菌麻风菌素试验活检等帮助诊断 二真菌性疾病 1 . 孢子丝菌病 本病由孢子丝菌引起常有外伤史；好发于四肢在侵入处产生皮下结节不红不痛结节扩大以后软化破溃形成溃疡愈后结疤之后损害沿淋巴管向上蔓延呈条状分布数目可多可少淋巴管可粗大真菌镜检或培养可助于诊断病理示慢性肉芽肿改变在巨噬细胞内可见圆形孢子有时见星状体 2 . 皮肤隐球菌病 为新型隐球菌引起开始可为软疣样或粉刺样丘疹结节脓肿不久中央溃破边缘界限清楚无红晕几个损害可以融合成较大的溃疡新膜常有溃疡损害好发于面颈胸及四肢真菌培养有助于诊断 3.组织胞浆菌病 由组织胞浆菌引起经过呼吸道皮肤黏膜胃肠膜传染主要侵犯肺骨髓肝脾淋巴结等皮肤黏膜损害开始为坚实之硬性斑块进而化脓破溃形成有痛性浅在性溃疡病理示巨噬细胞和组织细胞内可找到圆形等

生孢子培养可鉴定菌种 4.放线菌病足菌肿如卡氏菌病 为慢性化脓性疾病结节破溃后流出有颗粒的脓液可形成溃疡瘰管真菌检查可区别并确定诊断 5.黄癣脓癣 为头部真菌感染可有浅溃疡发生真菌镜检培养可确立诊断 三病毒性疾病 手足口病口啼疫可发生于手足口腔水疱破后形成小溃疡详见第四节 四性传播疾病 见本章第十七节 “ 黏膜损害 ” 皮肤阿米巴病 由溶组织阿米巴滋养体引起皮肤可发生深部脓肿和呈条索状边缘隆起的溃疡基底坏死有脓性血性黏液性脓液好发于腹部外阴及臀部分泌物中可查出阿米巴原虫组织病理可见淋巴细胞多核细胞浆细胞嗜酸性粒细胞浸润或深部肉芽肿形成血管及淋巴管内可见到阿米巴原虫 六血管性及血管炎性溃疡 1.雷诺征多见于女性好发于双手由阵发性小动脉 痉挛所致双手末端皮肤苍白即而呈紫绀色发红肿胀自觉麻木发冷或刺痛反复发作肢端可发生点状坏死溃疡 2.静脉曲张综合征性溃疡 可见于经常站立或下肢用力过多的成人先有下肢静脉曲张以后发生溃疡患肢肿胀局部皮肤表现湿疹样变下肢近深关节处常形成慢性溃疡周围常有色素沉着病程慢性 3 . 变应性血管炎 常为多形性损害可发生皮肤溃疡详见第四节 4 . 闭塞性血栓性脉管炎 好发于下肢下肢麻木苍白发作性疼痛间歇跛行足背动脉搏动减弱或消失严重者出现肢端溃疡和坏死为干性坏疽本病男性吸烟的青壮年多见 5 . Wegener肉芽肿病 为一种坏死性血管炎免疫反应可能为发病机理好发于成年人男性多于女性全身症状明显鼻咽气管发生数个结节鼻部结节通常溃破形成溃疡可侵及肺实质肉芽肿可发生于鼻口腔牙龈及舌部可发生溃疡或上跨穿孔皮肤表现为成群结节多发于四肢伸侧以后中央可发生坏死性溃疡亦可有红斑紫癜出血性皮炎等局灶性坏死性

肾炎为本病严重症状许多病人死于肾功能衰竭血中嗜酸粒细胞可高达0.80以上病理示动脉静脉坏死性血管炎及坏死性肉芽肿两型变化 6 . 致死性中线肉芽肿 本病多发于20 - 50岁男性病因不明损害发生于面部尤其是鼻部出现进行性破坏性肉芽肿性溃疡多在鼻中隔上可发展至面部和颅底部可有毁形性破坏 7 . 坏疽性脓皮病 本病病因不明常与其他疾病并发为一种皮肤复发性破坏性溃疡初起为丘疹水疱小结节很快中心坏死形成溃疡溃疡境界清边缘皮肤呈紫红色水肿并向下方组织呈潜行性破坏溢脓部分愈合又有新皮疹出现 8 . 硬红斑 病因不明可能与结核和血管炎有关多见于女性小腿屈侧好发对称数日不定皮下结节呈紫红色坚实可溃破形成溃疡病程慢性易复发病理示脂肪小叶炎症干酪样坏死周围血管炎改变炎细胞和巨噬细胞浸润 七 变应性皮肤病 固定性药疹长期不愈可发展为溃疡详见 本章第四节及第十八节 八 物理性皮肤病 1 . 射线皮炎 急性射线皮炎的III度损害可出现溃疡一般在照射剂量过度后发生慢性射线皮炎主要表现为干燥萎缩毛细血管扩张日久也可发生角化过度溃疡以致癌变 2 . 冻疮 冻疮为充血性紫红色水肿性斑重时可有水疱破后产生溃疡常发生于手足部位详见第四节 3 . 褥疮 系因体表长期受压所致好发于背骶髓坐骨结节和足跟处形成大小不等缺血性溃疡边界清楚无明显疼痛 九 肿瘤性溃疡 许多皮肤肿瘤可发生溃疡如鳞状细胞癌paget病普外paget病恶性黑色素瘤基底细胞癌Bowen病蕈样肉芽肿皮肤转移癌及皮肤附属器癌等均可发生皮肤溃疡这些肿瘤的一般临床表现详见肿瘤一节内容肿瘤的溃疡一般质地脆硬易于出血边缘隆起表面呈菜花状或乳头状穿凿状或蚕蚀状分泌物恶臭皮下浸润较深周围淋巴结可肿大 十 其他 1 . 高血压性缺血

性溃疡：多见于女性高血压患者外踝和小腿屈侧多见初起为痛性红斑继之破溃形成溃疡表面有黑褐色焦痂基底少量肉芽组织周围皮肤紫红色 2．神经功能障碍性溃疡：由末梢神经麻痹所致见于脊髓髓空洞症多发性神经炎病人的下肢或足底部多由外伤压迫和摩擦诱发开始为水疱继之形成圆锥形溃疡不痛周围角质增厚X线片可见局部骨质疏松 3．女阴急性溃疡白塞病：详见“葡膜损害”节 4．连续性肢端皮炎：详见“脓疮”节 5．结节性脂膜炎结节性脂肪坏死偶尔结节破溃流出油样物质形成溃疡

溃疡预防：1.精心护理补充蛋白质维生素输血能量合剂等以增加抵抗力控制感染也很重要2.保持局部卫生清洁防止病情发展

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com