

囊肿_全身_症状库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/608/2021_2022__E5_9B_8A_E8_82_BF__E5_85_A8_c22_608794.htm

囊肿概述：皮肤囊肿是具有囊腔结构外有囊壁内有液体或其他成分可来源于皮肤也可来源于间叶组织
囊肿病因：一先天性遗传性 1．毛根鞘囊肿 过去叫皮脂腺囊肿属常染色体显性遗传 2．多发性脂囊瘤为常染色体显性遗传 3．皮样囊肿 为先天性生后即有 4．支气管源性与甲状腺舌骨导管囊肿为先天发育不良异常所致 5．阴茎中线囊肿 为先天发育异常所致 6．发疹性炭毛囊肿 病因不清有的报告认为属常染色体显性遗传 二原因不明性 1．新液样囊肿 2．粟丘疹：原发性者原因不明继发性者多见于表皮大疱性松解症先天性外胚叶缺损迟发性皮肤叶林症皮肤磨削术后 3．表皮囊肿：原因不明
囊肿诊断：囊肿形态大多为圆形突出皮肤表面为半圆形一般多位于真皮及皮下组织因有囊壁包裹故边缘光滑整齐与周围组织粘连少故触之光滑有弹性及囊性感其表面皮肤多无炎症而呈正常皮色一般发展有限局性不会无限扩大造成局部压迫症状
囊肿鉴别诊断：一位于真皮内 1．部液样囊肿 多发生于40 - 50岁女性皮损好发于远端指关节背侧面多单发大小约3 - 15mm呈半透明光滑：柔软为皮肤色囊肿腔为我液其中散在有星状纤维母细胞 2．粟丘疹 多见于女性任何年龄原发性者原因不明；继发性者多发生于大疱性表皮松解症先天性外胚叶缺损迟发性皮肤叶林症皮肤磨削术后原发性皮损好发于眼睑颧部；继发性者好发于耳廓手背前臂大小为粟粒大质硬挑破见白色皮脂样物 3．毛根鞘囊肿 过去叫皮脂腺囊肿中年女性多见好发于头部与表皮囊肿

不易区别后者常见于面颈息干本病囊壁为鳞状上皮组成与毛囊峡部细胞相似腔的内容为嗜伊红物质 4 . 多发性脂囊瘤 可发生于各种年龄男女均可见皮损好发于前胸中下部及阴囊可单发或多发呈正常皮色或黄色直径数毫米至 1 - 2 cm质软小者略硬腔内容为油样或奶酪状 5 . 表皮囊肿 较常见好发生于青年儿童老年少见直径在0.5 - 5cm正常皮色圆形有弹性质略硬囊壁为正常皮肤囊腔内充满角质可单发或多发常发生于头皮面部颈及躯干 6 . 支气管源性与甲状腺舌骨导管囊肿为先天发育异常多见于胸骨切迹上方颈前或脚生后不久发生多单发损害较小常伴有瘦管二者表现相似其囊壁均为假复层柱状上皮组成可见上皮细胞纤毛突入囊腔 7 . 阴茎中线囊肿 为先天发育异常多见于青年人和儿童皮损位于阴茎腹侧尤其是龟头中线直径约数毫米囊壁为假复层上皮有些上皮细胞浆呈透明 8 . 发疹性衰毛囊肿 多见于儿童及青年为毛囊性小的囊肿大小为1 - 2mm表面可有痂皮及脐窝常见于胸部也可见于四肢相干背部囊壁为鳞状上皮囊腔为板层状角质及含毛囊壁凹陷形成毛囊样结构 二位于皮下组织 皮样囊肿：生后即有多单发皮损常位于眼周面部腹背中线体表各处均可发生直径不超过2 cm囊壁由复层鳞状上皮组成但与表皮囊肿不同其囊腔内含有各种表皮附属器如毛发含毛发的毛囊突入腔内 囊肿预防： 1 详细解释消除患者的顾虑2积极治疗原发病 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com