

脓疱_全身_症状库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/608/2021_2022__E8_84_93_E7_96_B1__E5_85_A8_c22_608797.htm 脓疱概述：脓疱

(pustule) 是一局限性表皮空腔隆起内含混浊的脓液系原发于皮肤由丘疹水疱演变而成脓疱大小深浅不等周围可有炎性红晕浅脓疱干涸后变成脓痂愈后不留瘢痕脓疱较深可形成溃疡愈后可留瘢痕脓疱病因：脓疱的发生机理因病因不同差异有些疾病表现的脓疱病因仍不明了但脓疱腔内均有大量的白细胞存在病毒性痘样脓疱由不同的病毒通过飞沫或接触传染感觉人体后经一系列免疫反应发生表皮内或表皮下脓疱其典型的变化可使表皮发生网状变性和气球状变性亦可有不同病毒的包涵体细菌感染的脓疱多由葡萄球菌链球菌感染引起感染途径为原发感染和继发感染原发感染是致病菌直接侵入皮肤引起脓疱如传染性脓疱疮其发病机理病原菌起主要作用继发感染是发生于原有皮损的基础上一般为多种细菌的混合感染如传染性湿疹样皮炎引起细菌性脓疱的致病因素病原菌在皮肤上大量繁殖或接触外来毒力较强的菌株表皮破损使病原菌易于侵入小儿皮肤薄嫩抵抗力差易受感染代谢失调营养不良疲劳或某种免疫功能缺失的易感性非感染性脓疱为无菌性脓疱一般病因尚不清楚如脓疱样脓疱病脓疱型银屑病等有认为与病灶感染内分泌失调免疫功能异常等因素有关 (一) 感染性脓疱 1.病毒性痘样脓疱Kaposi水痘样疹种痘反应牛痘样湿疹天花羊痘牛痘挤奶人结节 2.细菌性炎性脓疱 传染性脓疱疮大疱性脓疱疮深脓疱疮新生儿脓疱疮毛囊性脓疱疮坏死性痤疮须疮秃发性毛囊炎手(足)表浅性大疱性脓皮病脓疱性细菌

疹传染性湿疹样皮炎 3.真菌 螺旋体 蠕虫 感染性脓疱 见于黄癣 脓癣 脓疱性梅毒 疹疥疮 毛囊虫皮炎等 (二) 非感染性脓疱 本组疾病 无菌性小脓疱 大多病因不十分明了 如脓疱型银屑病 疹样脓疮 病角层下脓疱 病掌跖脓疱 病连续性肢端皮炎 婴儿肢端脓疱 病嗜酸性脓胞性毛囊炎 脓疱性粟粒疹 药物如溴剂 碘剂引起的脓疱 脓疱诊断：一 病史 了解脓疱最初发生的特点 部位 次序 发展快慢 是原发或由水疱转为脓疱 发病的年龄 性别 病期 及了解发病原因 区分是感染性脓疱或非感染性脓疱 痘样脓疱 见于病毒感染 一般有流行医学接触史 种痘反应 有牛痘疫苗接种史；牛痘样湿疹是种痘后或有种痘者接触史 羊痘 牛痘 挤奶人 结节均有患病 羊牛接触史 疑团莫释感染的脓疱为一种急性化脓性感染 一般在红斑的基础上发生脓疱 周围有炎性红晕 轻者仅有局部症状 重者可有发热 畏寒 白细胞升高等全身症状 一般有局部淋巴结肿大 发病年龄也有助于诊断 如传染胜脓疱疮 多见于儿童 新生儿脓疱疮 见于新生儿 坏死性痤疮 须疮 易发于30 - 50岁 男性 秃发性毛囊炎 多见于青壮年 有些脓疮好发于一定的部位 如黄癣 脓癣 发生于头皮 毛发部位 了解病史 须注意个人传染接触史 如疥疮 有感染接触史 梅毒引起的脓疮 则有冶游史 及一期梅毒史 二 体格检查 (一) 脓疗的性质 脓疮表浅 松弛 胞壁较薄 为角层下及表皮内脓疮 见于泛发性脓疮型银屑病 角层下脓瘤 病疹样脓疮 病传染性脓疮 病新生儿脓疮 病等 脓疮顶部有脐窝 为病毒性感染的特征 脓疮底部有积脓现象 见于大疱性脓疮 疮周有炎性红晕 常有附近淋巴结肿大 (二) 脓疗的部位与数目 脓疮发生于掌路部 见于掌路脓疮 病脓疮性细菌疹 及掌路脓疮型银屑病 连续性肢端皮炎的脓疮 最初发生于指趾末端 发生于头部的脓疮 见于黄癣 脓癣 秃发性毛囊炎 坏死

性痤疮的脓疱发生于面部及胸背中心部 (三) 脓疗的排列形态对诊断很有意义脓疮排列呈环形或弧状见于角层脓皮病疮疹样脓疱病脓疮融合成糊状则见于泛发性脓疮型银屑病痢疹样脓疱病 三实验室检查 病毒感染的脓疮外周血粒细胞偏低或正常如合并感染粒细胞可略增高病原微生物DNA基因检测有助诊断组织病理具有特征性可见网状变性及气球状变性在癌底的气球状细胞含有病毒包涵体细菌性脓疮伴有粒细胞升高脓液培养有致病菌生长由于感染的菌株不同及病变的部位深浅不同组织病理表现为脓疮坏死嗜中性粒细胞浸润等炎症反应真菌感染的脓疮真菌直接镜检阳性培养见菌长脓性梅毒憾血反应阳性 非感染性脓瘤细菌培养一般阴性可根据不同情况必要时查血常规免疫球蛋白组织病理有助于诊断脓疮鉴别诊断：一病毒性痘样脓疱 1. Kaposi水痘样疹 系由单纯疱疹病毒牛痘病毒及柯萨奇A；病毒感染多发于儿童也见于成人在原有皮肤病的基础上突然发生多数脐窝状水痘迅速变成脓疮伴发热等症状 2. 种痘反应 是由减毒的牛痘疫苗接种于人体产生反应发生牛痘从而产生对天花的自；动免疫在接种后 3 - 6 d局部出现脐窝性水疱继而脓疮结痂约3周左右脱哪留一癍痕 3. 牛痘样湿疹 又称种痘性湿疹为湿疹患儿种痘或有种痘接触史潜伏期数日至2周在原有皮损处及正常皮肤上发生扁平坚实的水疱迅速变成脓疮 4. 天花 系天花病毒感染的烈性传染病天花在我国早已完全消灭1979年世界卫生组织宣布全世界消灭了天花病本病突然高热3d发生脓疮愈后遗留癍痕 5. 羊症 又称传染性脓疮性皮炎由感染羊痘病毒所致见于接触病羊的人在接触部位发生类似牛痘的脓疮初为丘疹水疮继而呈脓疮愈后可遗留浅癍痕 6. 牛痘 是牛的一种传染病系牛痘

病毒感”染亦可通过接触传染给人潜伏期5 - 7d在接触部位发生脐窝性脓疮可伴有发热及淋巴结炎7 . 挤奶人结节 又称副牛痘系接触副牛瘟病毒引起多发于挤牛奶者潜伏期5~14 d在手或前臂发生二个或数个扁平红色丘疹结节继而在顶部出现脐窝状脓疮消退后不留瘢痕 二细菌性炎性脓疮 1 . 传染性脓疮疹 俗称黄水疮由溶血性链球菌或葡萄球菌混合感染多见于学龄前儿童常在托儿所中流行好发于颜面口周耳廓及四肢露出部位为群集脓疮周围红晕疱壁薄易破形成糜烂面脓液干燥结成蜜黄色痂 2 . 大疫性脓疮疹 由金黄色葡萄球菌感染初为豆粒大水疮很快增大至花生米或更大周围红晕较轻疮液初为淡黄色继而化脓混浊脓汁沉积疮底呈半月形积脓现象疱壁薄易破呈糜烂结痂 3 . 深脓疮疹 又称疔疮由B型链球菌引起或金葡菌混合感染多见于成人或老年人好发于小腿臀部或腰部为炎性红斑上出现脓疮破溃向深部发展形成溃疡自觉灼痛与病痒愈后可遗留瘢痕 4 . 新生儿脓疮疹 由金黄色葡萄球菌引起亦有认为凝固酶阳性葡萄球菌71型II类所致直接或间接传染见于出生后4 - 10 d的婴儿起病急骤在面部相干或四肢突然发生大疮疱液很快混浊呈脓性疱周有红晕疱壁薄易破露出鲜红色糜烂面皮损迅速扩展大部皮肤伴发热可并发败血症肺炎或脑膜炎而死亡 5 . 毛囊性脓疮疹 又称浅脓疮性毛囊炎为葡萄球菌感染儿童或成人均可发生皮损为毛囊性浅表小脓疮绿豆或黄豆大周围有红晕疾痒或灼痛感7 - 10 d痊愈不留瘢痕 6 . 坏死性痤疮 又称痘疮样痤疮一般认为是机体对葡萄球菌抗原的过敏反应多见于30 - 50岁男性好发于额部颌部颊部或胸背中心皮损为红色毛囊性脓瘤坏死轻度凹陷形成部着性痂病程慢性愈合的留痘样保痕 7 . 须疮 为葡萄球菌感染见于男性成人

胡须部位皮损为红斑上的毛囊性丘疹脓疮中心贯穿毛发结痂消退后新疹反复发生 8 . 秃发性毛囊炎 脓疮中培养出金黄色葡萄球菌亦有认为是对此菌过敏所致多发于青壮年好发于头皮亦可发于胡须腋毛阴毛等处为红色毛囊性丘疹性脓疮愈后遗留原痕性秃发 9 . 传染性湿疹样皮炎 发病前在患处附近有感染灶使病灶周围皮肤对细菌或组织分解产物致敏而发生湿疹样改变除红斑丘疹水疱外可见有脓疮常伴局部淋巴结肿大 10 . 脓疫性细菌疹 为细菌感染灶引起的一种过敏反应疹表现为手掌及足路发生脓疮亦可发生手指初起时在手掌足两中部发生水疱很快变成脓疮一般指趾缝不受侵犯脓疮成批出现自觉疫痒病程慢性反复发生嗜中性粒细胞可增高但疮液内不含细菌培养阴性 三真菌螺旋体螨虫感染的炎性脓 1 . 黄癣 由许兰毛菌感染引起多在儿童期发病先是头皮毛根部发红继而发生小脓疮结蝶形黄色脓痂痂下为糜烂面或溃疡易破坏毛囊真菌检查阳性愈后遗留萎缩性瘢痕及秃发 2 . 脓癣 以铁锈色小孢子菌大小孢子菌感染多见在头癣的基础上发生毛囊性脓疮毛囊周围炎波动性脓肿挤压时脓汁从毛孔如筛状溢出有压痛真菌检查阳性愈后可留秃发性瘢痕 3 . 脓疫性梅毒疹 为梅毒螺旋体感染二期梅毒疹的一种类型其脓疮为发生于红斑上的小脓疮脓疮干涸结痂或形成浅溃疡散发于躯干四肢或面部特别在手掌足两对称性损害为特征性亦可发生痤疮样或痘疮样脓疮发病前有冶游史及一期梅毒史梅毒血清试验阳性 4 . 疥疮 主要由人型疥螨引起（详见本章第三节丘疹）但婴幼儿疥疮等掌两常有脓疮此外有一型称之为挪威疥表现为脓疮脓痂感染化脓有特殊的臭味可侵犯头面部伴有鳞屑脱落 四非感染性无菌性小脓疮 （一）脓疮型银屑病 是银屑病的一种特殊

类型分为泛发性和掌跖性两种：1. 泛发性脓疱型银屑病 本病的发生常与银屑病治疗不当或因上呼吸道感染等继发在原有银屑病皮损上突然红斑加重继而出现密集的无菌性小脓疱表面覆以鳞屑部分融合增大呈“湖状”脓疮泛发可出现糜烂结痂常伴有发热关节肿痛嗜中性粒细胞升高等全身症状 2. 掌跖脓疱型银屑病 脓疮发生于手掌及足路部对称性初为红斑继而出现粟粒大无菌性小脓疱疱壁较厚经1 - 2周脓疮干涸结痂痂皮脱落后又出现新的脓疮指甲常受累在身体其他部位可见银屑病皮损也有先发生掌跖脓疱而后发生银屑病皮损 (二) 疱疹样脓疱病 多见于孕妇病因不明亦有认为是脓疮型银屑病的变型但不伴有银屑病皮损脓疮好发于腋下浮房下及腹股沟以后泛发全身为大片红斑上成群的无菌性浅脓疮针头至绿豆大相互融合周围有红晕用排列呈环状或不规则形新膜及指甲可受累常伴有高热畏寒呕吐腹泻关节痛等症状 (三) 角层下脓疱病系一种慢性复发性浅表性脓疱病中年妇女多见病因不明皮损对称发生于腋下者房下腹股沟在干及四肢近端屈侧为群集性松弛的浅表性小脓疮排列呈弧状或环状一般无全身症状病程慢性反复发生组织病理为角层下脓疱 (四) 掌路脓疱病病因不明一般有病灶感染及金属致敏学说亦有认为与脓疮性细菌疹为同一疾病脓疮发生于掌路部位路部比掌部多见路部易发于足弓部掌部易发于拇指小指掌面及掌中央好好发于30~50岁女性较男性多见细胞为粟粒至绿豆大无菌性小脓疮周围有炎性红晕5 - 7d脓疮干涸结咖啡色痂新疹又不断出现伴有掌路皮肤增厚角化脱屑及不同程度的瘙痒组织病理为棘层内单房性脓底泡内为嗜中性粒细胞 (五) 连续性肢端皮炎 亦称固定性肢端皮炎或匍行性皮炎是一种慢性复发性脓疮性皮

肤病病因不明发病前常有微小的外伤史初发于一个手指或足趾末端背侧皮肤的化脓性感染后渐扩大出现成群的小脓疮糜烂结痂坏死形成环状损害皮损不断发展可累及其他指趾或扩大到手足背及前臂口腔黏膜及指甲可受累（六）嗜酸性脓疱性毛囊炎 病因不明多见于青壮年好发于脂溢部位如面胸背肩 上肢伸侧为毛囊性红色丘疹顶端出现脓疮群集分布周围有炎性红晕病程慢性反复发生白细胞增多嗜酸细胞计数升高组织病理外毛根鞘细胞内细胞间水肿嗜酸性粒细胞嗜中性粒细胞和单核细胞浸润毛囊内脓肿形成（七）脓疱性粟粒疹 又称脓疱性痱子是摊子的一种类型表现为散在孤立的浅表性小脓疮针头大脓疮与毛囊无关为无菌性好发于皮肤皱褶部位躯干或四肢屈侧（八）婴儿肢端脓疱病 病因不明常发生于出生后1月至1年以内到2岁以后自然痊愈损害为成批发生的1~3规的脓疮主要见于肢端组织病理为角朊细胞空泡化变性引起单房性脓疮疮内存满嗜中性粒细胞或存有嗜酸性粒细胞其脓疮下方真皮有单核细胞嗜中性粒细胞浸润脓疱预防：（1）注意皮肤卫生儿童内衣要勤洗勤换特别是夏季勤洗澡勤剪指甲（2）生了痱子或瘙痒性皮肤病应及时治疗避免细菌感染（3）发现有本病的苗头如有丘疹脓疱应及时就医不得拖延时间更不能随便涂用激素类药物或反复洗患处这样会使病情迅速扩延（4）婴儿室或托儿所发现本病应立即隔离消毒对工作人员加强卫生教育（5）对体弱儿童应加强营养增强抵抗能力（6）夏季给小儿多饮用一些家常清暑饮料如西瓜汁绿豆汤等（7）及时治疗皮炎痱子湿疹及其他瘙痒性皮肤病（8）中药：市售的金银花露或用金银花9克杭白菊9克生甘草1.5克煎汤让小儿代茶饮用 100Test 下载频道开通，各类考试

题目直接下载。详细请访问 www.100test.com