

男性乳房发育症_胸部_症状库 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/608/2021_2022__E7_94_B7_E6_80_A7_E4_B9_B3_E6_c22_608864.htm 男性乳房发育症概述

：男性乳房发育症比较常见见于某些正常生理状态也可见于某些疾病男性乳房发育症病因：一病因分类及发病机理较复杂发病机理可能有以下几个因素：（一）雌激素相对或绝对增多 睾丸酮在体内能转化为雌激素对特别敏感的乳腺组织睾丸酮本身也能引起增生（二）垂体促性腺激素增多 特别是其中的促黄体生成激素即泌乳激素能引起乳腺导管间结缔组织产生脂肪组织增加（三）乳腺组织对男性体液中正常的微量雌激素的敏感性增强（四）雌激素或有雌激素类作用的药物如利血平异烟肼绒毛膜促性腺激素的应用男性乳房发育症诊断：注意服药史体检时注意甲状腺睾丸及腹内肿物的有关体征测定肝功能尿酮类固醇尿雌激素及促性腺激素水平口腔黏膜性染色质检查肾上腺CT扫描蝶鞍X线摄影检查内分泌腺体肿瘤男性乳房发育症鉴别诊断：（一）生理性男性乳房发育症1．新生儿乳房大生后一周左右消失极少数可持续数年系血循环中及胎盘产生的雌激素影响2．青年发育期男孩或早或晚有不同程度的乳腺发育约占男孩70%可能由于此间乳腺组织敏感性增强多持续数年逐渐自行消失也可终生不消退称为特发性乳房发育3．中年以后男子开始性功能减退时常有一过性乳房发育可能由于垂体促性腺激素分泌增加引起性激素的平衡失调（二）病理性男性乳房发育症1．睾丸肿瘤如绒毛膜上皮癌间质细胞瘤2．伴有女性化的肾上腺皮质肿瘤常为恶性发生于青春期或成年人除乳房发育外伴有睾丸萎缩

阴茎缩小性功能减退尿中酮类固醇及雌激素排量增多 3 . 甲状腺功能减退 可能伴随促甲状腺激素促性腺激素及其他垂体激素增多 4 . 性腺发育异常 如男子假两性畸形睾丸发育不良伴有垂体促性腺激素增多 5 . 肝硬化肝癌及肝炎等肝功能受损 可能由于体内雌激素灭活作用减弱使雌激素水平增高 6 . 营养不良恢复期 由于长期营养不良或慢性消耗性疾病对缺乏蛋白质敏感性的性腺和垂体功能一旦营养得到改善体力逐渐恢复后垂体促性腺激素分泌功能重新活动所谓第二次青春发育期性腺功能重新活跃但长期受损的肝功能不能以相应速度恢复而致内分泌紊乱其机理似相当于肝硬化和特发性乳房发育的合并存在这类患者常伴有肝肿大或肝功能障碍 7 . 药物 如利血平异烟肼等是否由于其有类似雌激素的作用意见尚有分歧绒毛膜促性腺激素的应用也可使乳腺发育 8 . 其他 如某些自身免疫性疾病脊髓创伤所致截瘫以及支气管癌肺结核或支气管扩张等特别应除外乳腺癌男性乳房发育症预防：修身养性保持心情舒畅；加强体育锻炼节制房事避免过劳；饮食富含营养而易消化的食物忌肥腻避免寒冷及刺激性食物；积极治疗各种原发病；慎用可能扰乱内分泌的药物 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com