

新生儿脐炎_儿科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/608/2021_2022__E6_96_B0_E7_94_9F_E5_84_BF_E8_c22_608947.htm

脐炎系因断脐或出生后处理不当，脐残端被细菌繁殖感染而引起炎症，以葡萄球菌及大肠杆菌感染多见。脐炎可发展为脐动脉炎及脐静脉炎，细菌进入血循环可致败血症，或局部扩散成腹膜炎。【诊断】

（一）临床表现 轻者脐轮与脐周皮肤轻度红肿，伴少量脓性分泌物。重者脐周明显红肿发硬，脓性分泌物多有臭味，并向周围皮肤扩散成腹壁蜂窝组织炎，或向腹膜蔓延导致腹膜炎；或由血管蔓延致败血症。慢性脐炎常形成肉芽肿，表现为小的樱红色肿物，脓性溢液，经久不愈。（二）化验 脐分泌物细菌培养或血培养。【鉴别诊断】（一）卵黄管未闭

（脐肠瘘）由脐孔注入造影剂，x线检查可见其进入回肠。须外科治疗。（二）脐尿管瘘 注造影剂后，x线检查可见其进入膀胱，或静注美蓝后可见兰色尿液由脐部排出。（三）脐窦 由卵黄管回肠端闭合，而脐端未闭所致。探针检查可发现窦道或有球状息肉块，称为脐茸或脐息肉，应手术切除。

【治疗】（一）轻症只需局部用3%过氧化氢和75%酒精清洗，或用抗生素局部湿敷或抗生素油膏外敷。（二）脓液较多，有局部扩散或有全身症状者，可根据涂片或细菌培养结果选用适当抗生素。（三）脐部有肉芽肿可用10%硝酸银溶液局部涂搽。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com