

小儿支原体肺炎\_儿科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/608/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B0\\_8F\\_E5\\_84\\_BF\\_E6\\_94\\_AF\\_E5\\_c22\\_608975.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/608/2021_2022__E5_B0_8F_E5_84_BF_E6_94_AF_E5_c22_608975.htm) 【诊断】（一）临床表现 支原体肺炎是儿童和青少年时期最常见的肺炎。1.起病可急可缓，呼吸道症状突出，表现为剧烈阵咳、痰少。2.肺部体征少，大部分病人仅呼吸音粗或减低。3.部分病人有肺外损害，例如神经系统损害，包括无菌性脑膜炎和脑膜脑炎、心肌炎、溶血性贫血、血小板减少等。此外还可并发皮疹和肌肉、关节病变。4.本病病情一般较轻，发热持续1~3周，咳嗽可延长至4周或更长。严重肺外并发症可能危及生命。（二）肺部x线表现1.大片阴影，以右肺中、下野为多见。2.弥漫或局限性纹理增多为间质型。3.间质病变基础上并有斑片影为混合型。（三）实验室检查1.血清冷凝集素测定大部分病人 $>1:64$ 。2.支原体抗体(igm)阳性可协助诊断。【治疗】治疗原则与一般肺炎大致相同，控制感染常选用大环内酯类抗生素，如红霉素、柔红霉素、克拉霉素、阿奇霉素等。重症病人红霉素疗效不满意者可加用利福平。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)