

小儿肺不张\_儿科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/608/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B0\\_8F\\_E5\\_84\\_BF\\_E8\\_82\\_BA\\_E4\\_c22\\_608980.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/608/2021_2022__E5_B0_8F_E5_84_BF_E8_82_BA_E4_c22_608980.htm) 一侧、一叶或一肺段内气体减少和体积减少，叫做肺不张。【诊断】（一）临床表现1. 轻者可无自觉症状或咳嗽久治不愈。重者可出现呼吸困难，发绀等。2. 胸部体征仅在病变范围较大时可有肋间隙变窄，气管、心脏移位，呼吸音减弱。（二）x线检查为肺不张诊断的主要依据，其表现为不张肺叶容积缩小，密度增加，相邻的叶间胸膜向不张肺叶移位，肺纹理和支气管呈聚拢现象。常见：1. 一侧肺不张。2. 上叶肺不张。3. 右中叶肺不张。4. 下叶肺不张。（三）纤维支气管镜检查这是肺不张病因诊断中最有价值的手段。能直接窥视支气管情况，确诊有无异物，取活检。【治疗】（一）去除病因。（二）控制感染 应用敏感抗生素或抗结核治疗。（三）取异物 应用支气管镜取异物或吸出分泌物。（四）肿瘤 应用手术。（五）体位引流 变换体位或体位引流。同时口服祛痰剂，超声雾化。（六）肺叶切除 经内科治疗而肺不张仍持续12~18月以上，考虑手术肺叶切除，术前需做支气管碘油造影。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)