

小儿支气管扩张_儿科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/608/2021_2022__E5_B0_8F_E5_84_BF_E6_94_AF_E6_c22_608982.htm 支气管扩张可分为先天性及后天性两大类：一是先天性支气管扩张：较少见，可因支气管软骨发育缺陷所致；二是后天性支气管扩张：常见于麻疹、百日咳、毛细支气管炎、重症肺炎及哮喘后，表现为双侧弥漫性支气管扩张。由于异物阻塞，支气管淋巴结结核或肿瘤压迫所致支气管扩张，多为局限性。【诊断】（一）病史 慢性咳嗽，大量脓痰，可有反复咯血，早晚及变换体位时咳痰明显。（二）体征 早期轻症病人无明显体征，病变严重或继发感染时有发热，气急，胸痛，并逐渐出现消瘦、桶状胸、杵状指（趾）及肺内干湿音等。（三）x线像特点 肺纹理增多，卷发状阴影或支气管双轨征。（四）确诊 支气管造影或肺ct看到扩张的柱状、囊状或囊柱状支气管树。支气管造影可靠，但有一定危险性，必要时手术前为进一步确诊病变范围、程度，做这项检查。【治疗】（一）体位引流 依病变部位不同进行体位引流，同时配合理疗，雾化，拍背排痰，服祛痰药。（二）抗感染 尽可能根据病原选用抗生素2~3周或局部灌洗1次/1~2周。（三）免疫调节治疗 适于免疫功能低下的病人。（四）手术 重症病变局限一侧或一个肺叶，感染不易控制时应手术切除。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com