

小儿先天性肺囊肿_儿科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/608/2021_2022__E5_B0_8F_E5_84_BF_E5_85_88_E5_c22_608983.htm

先天性肺囊肿是较常见的先天性肺发育畸形，在胚胎发育期，由于气管和支气管异常的萌芽或分支而形成囊肿，如由一个支气管芽形成，即为单发肺囊肿，如为几个支气管芽同时隔断即为多发支气管囊肿，根据病理分为支气管源性、肺泡源、混合性三种。【诊断】（一）病史 小囊肿可无症状，体检时偶然被发现。大囊肿可有呼吸快、缺氧、发绀。继发感染时发热、咳嗽、咳痰，偶有咯血。（二）体征 大的含气囊肿部位叩诊清音，听诊呼吸音减低或消失。继发感染时可闻音。（三）x线像呈单发或多发含气囊状影，实性圆形或椭圆形阴影，有时可见气液面，大的囊肿可压迫纵隔，心影移位。【治疗】1. 如合并张力性气胸需紧急处理，穿刺减压或闭式引流。2. 一经诊断均应手术切除，继发感染时应先控制感染，再手术。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com