

小儿风疹\_儿科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/609/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B0\\_8F\\_E5\\_84\\_BF\\_E9\\_A3\\_8E\\_E7\\_c22\\_609124.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E5_B0_8F_E5_84_BF_E9_A3_8E_E7_c22_609124.htm) 风疹 (rubella german measles) 是由风疹病毒引起的急性呼吸道传染病，前驱期短，全身症状轻，2~5岁小儿多见。【诊断】(一)临床表现潜伏期10~21天。1. 前驱期发热半日至1日，伴有轻度上呼吸道症状。2. 出疹期从头面部开始，然后颈、躯干、四肢，24小时遍布全身。皮疹为淡红色或红色斑丘疹，疹间可见正常皮肤，与麻疹相似，无粘膜斑。出疹期热度不再上升。2~3天皮疹消退。常伴耳后、颈后、枕部及全身浅淋巴结肿大和脾肿大。3. 恢复期皮疹消退后无脱屑或色素沉着斑，此点也可和轻型麻疹区别。淋巴结及脾肿大逐渐消退，极少数可并发脑炎、关节炎或血小板减少性紫癜。4. 先天风疹综合征妊娠\*个月内孕妇感染风疹后，风疹病毒可通过胎盘使胎儿宫内感染，可致死胎、早产或各种畸形，最常见的有白内障、心血管畸形、聋哑、小头畸形，以及肝脾肿大等，称先天风疹综合征。妊娠4~8周内感染风疹婴儿畸形率多达50%~100%，第2个月感染畸形率30%，第3个月为20%，第4个月为5%。5. 进行性风疹全脑炎一种罕见的中枢神经系统慢病毒感染，患儿有先天性风疹史，一般出生数年后发病。表现为进行性共济失调，强直和痴呆等。病程慢，预后差。(二)实验室检查必要时做以下检查有助于诊断：1. 血象白细胞总数下降，淋巴细胞比例最初1~2日减少，以后增高。2. 病毒分离取患儿的鼻咽分泌物分离病毒。先天性风疹病儿可取尿、血、脑脊液或骨髓分离风疹病毒，用单克隆抗体和原

位杂交法从胎盘可检测到病毒。3. 血清学试验用红细胞凝集抑制试验、中和试验、补体结合试验或免疫荧光试验，双份血清抗体效价4倍以上增高为阳性。可测到血清中特异性igm和igg抗体。出生时如有特异性igm抗体增高，有助于先天性风疹的诊断。【鉴别诊断】应与麻疹、猩红热、幼儿急疹等相鉴别（见各病专节）。【治疗】（一）加强护理发热时卧床休息，给易消化饮食。（二）对症治疗可给予清热解毒中药口服液、维生素c等。【预防】（一）隔离患儿应至出疹后5天。（二）应用单价风疹减毒活疫苗或“风疹-麻疹”“风疹-腮腺炎”二联疫苗，或“麻疹-风疹-腮腺炎”三联疫苗进行自动免疫。95%的易感儿可产生抗体，6~8周达高峰，有效抗体效价可维持7年以上。育龄妇女可采用上述疫苗接种。因疫苗本身亦可引起胎儿畸变，所以不能在孕期接种，至少应在怀孕半年前接种。如妊娠早期已感染风疹，血中又测出抗风疹病毒igm抗体者，应终止妊娠。（三）对体弱儿及妊娠早期孕妇，于接触风疹患者5天内注射特异性高效价免疫球蛋白20—30ml可起到预防作用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)