

幼儿急疹\_儿科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/609/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B9\\_BC\\_E5\\_84\\_BF\\_E6\\_80\\_A5\\_E7\\_c22\\_609125.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E5_B9_BC_E5_84_BF_E6_80_A5_E7_c22_609125.htm)

幼儿急疹(exanthem subitum)又称婴儿玫瑰疹(roseola infantum)，也称第六病，可能是病毒引起的一种发疹性疾病，以高热3~4日、热退疹出为特点。病初难以诊断。多发生在2岁以下的婴儿，6个月以下的婴儿更多见。【诊断】(一)临床表现潜伏期8~14天，平均10天。1.起病急，骤高热达39~40℃，但全身症状轻，可伴有轻度咳嗽，腹泻，偶于病初有高热惊厥者。2.3~4天后热退疹出，疹型不一，一般为2~3mm大小不等的淡红色斑丘疹，面部较少，躯干多，肘膝以下无皮疹，1~2日消退，不留痕迹，偶见中毒性脑病或脑炎。3.枕后及颈部淋巴结轻度肿大。(二)实验室检查外周血白细胞减少。【治疗】无特效疗法，主要为对症治疗，高热时给予药物退热或物理降温，可用清热解毒中成药，有高热惊厥者给予止惊药及退热。腹泻时可给乳酶生、胃蛋白酶等。【预防】隔离患儿至皮疹消退。集体托幼机构，对接触者的易感儿进行观察10日，如有发热，宜隔离治疗。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)