

小儿包虫病_儿科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E5_B0_8F_E5_84_BF_E5_8C_85_E8_c22_609146.htm 包虫病

(echinococcosis)是人类感染棘球绦虫的幼虫而引起的疾病。当人吞食了细粒棘球绦虫的虫卵后，虫卵内的六钩蚴在胃肠道脱壳而出，穿过肠壁随血流至肝、心、肺以及全身的组织器官，发育成棘球蚴(又称包虫)而致病。以肝包虫病多见，肺包虫病次之，肌肉、骨骼、肾、脑、心、脾、腹膜、肠系膜和眼睛中均可发生，除压迫症状外，并可引起周围组织的炎症。【诊断】(一)临床表现 症状视包囊虫的大小(小者如乒乓球、大者如篮球)、所寄居的部位及有无破裂而异。包囊小而无破裂者可无明显症状，大者则可发生压迫症状，破裂时可出现休克。平时一般可有消瘦、虚弱及贫血等。1. 肝包虫病 肝脏肿大，上腹饱胀，包囊体积大者可引起周围组织压迫症状或继发感染引起肝脓肿。肝区可触及无痛的囊性肿块。肝功能多正常。2. 肺包虫病 往往有干咳、咯血等症状。病变多发生在右肺，且以下叶为多。3. 脑包虫病 少见，但多发生于儿童，多位于顶叶，主要表现为癫痫发作和颅内压增高。(二)实验室检查1. 外周血可有贫血表现，嗜酸粒细胞可轻度增多。2. 皮内试验或补体结合试验可为阳性。3. 肝包虫病可进行超声波检查。4. 肺包虫病或骨包虫病可进行x?线检查。5. 脑包虫病要做脑电图和颅脑ct检查。

【治疗】(一)手术治疗 以外科手术治疗为主。手术时先将囊内液体抽净(以防囊液外溢，引起过敏性休克)。注入10%福尔马林溶液，待5~10分钟以杀死包虫，然后切开囊

腔，将子囊取净后将内囊摘除。（二）药物治疗位于脑内或多房囊型者不易施行手术，或手术后又复发者，可口服甲苯咪唑，成人每天2~3次，每次200mg，儿童酌减。【预防】（一）流行区的儿童应避免与狗密切接触。（二）彻底处理病犬，对患病牲畜（如牛、羊、狗等）的尸体应深埋或焚毁，不可以病牛、羊肉喂狗。（三）注意饮食卫生，不吃生菜、生肉。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com