

小儿中华分枝睾吸虫病_儿科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E5_B0_8F_E5_84_BF_E4_B8_AD_E5_c22_609148.htm 中华分枝睾吸虫病

(*clonorchiasis sinensis*) 又称为肝吸虫病，是中华分枝睾吸虫寄生于人类肝内、胆小管所致的疾病。在我国分布甚广，以习惯食生鱼、半生鱼的地区多见，其中以广东为最多。轻者可无症状，重者可引起消化功能失调和胆汁性肝硬化。感染严重的儿童可致生长发育障碍。【诊断】(一) 流行病学史居住在流行地区，有生食淡水鱼、虾的历史。(二) 临床表现1. 幼儿多无症状，只在检查粪便时发现虫卵方知感染。2. 较大儿童可有食欲减退、腹痛、腹泻、肝脏肿大。3. 严重者可可见消瘦、贫血、发育障碍，甚至肝硬变症状，如黄疸、便血、腹水和维生素a缺乏。(三) 实验室检查1. 外周血嗜酸粒细胞增多。2. 粪便直接涂片或沉淀集卵法查到早虫卵即可确诊。3. 十二指肠引流从胆汁或十二指肠引流液中查找虫卵。4. 肝穿刺组织中找到虫卵或手术时于胆道中发现成虫。5. 抗原皮内试验的阳性率高，但须注意与由血吸虫、肺吸虫引起的假阳性鉴别。6. 血清学试验如间接荧光抗体、对流免疫电泳等可辅助诊断。【治疗】(一) 一般疗法加强营养，纠正贫血，保肝治疗，如有胆道继发感染时应进行抗菌治疗。病情好转后可进行驱虫。(二) 病原治疗1. 吡喹酮为本病首选药物。剂量为每次25mg/kg，每日3次，服用1日即可。粪便阴转率可达%%~100%。2. 呋喃丙胺儿童为60mg/(kg·d)，分3次口服，14日为一疗程。副作用为食欲不振、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、便血及抽搐。反应严重者

应减半剂量或停药。3. 硫双二氯酚（别丁）儿童为50mg/(kg·d)，分3次口服，连服20～30天为一疗程。4. 氯化喹啉儿童为10mg/(kg·d)，分3次口服，6～8周为一疗程。【预防】（一）加强卫生宣教。改变生吃鱼虾的习惯。（二）彻底治疗患者。（三）加强粪便管理。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com