

小儿姜片虫病_儿科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E5_B0_8F_E5_84_BF_E5_A7_9C_E7_c22_609150.htm 姜片虫病

(fasciolopsis) 是布氏姜片虫寄生于人体十二指肠内所引起的肠道寄生虫病。姜片虫的虫卵在水中和扁卷螺体内发育成尾蚴后，吸附于菱角、茭白、荸荠和藕等水生植物上形成囊蚴，当人类生食此类食物时即感染得病。主要表现为腹痛、腹泻、营养不良和贫血等。【诊断】(一) 流行病学史 来自流行区并有生食菱角、茭白、荸荠、藕等水生植物的历史。(二) 临床表现 轻者常有食欲不振、腹痛、腹泻、消化不良和轻度贫血。重者腹痛、腹泻加重，也可有腹泻与便秘交替出现，常有恶心、呕吐、腹胀、肠鸣、腹水和肠出血等。久之则有消瘦、乏力、萎靡、水肿、肝大，贫血更为严重以及多种维生素缺乏症，虫体成团时可引起肠梗阻。儿童长期患病可影响生长发育而致成侏儒。(三) 实验室检查)1. 血常规检查 红细胞及血红蛋白可减少，嗜酸粒细胞增多。2. 粪便检查可检到虫卵或有成虫排出。【治疗】(一) 一般疗法加强营养，纠正贫血，必要时输血以增强体质。(二) 病原治疗1. 吡喹酮为首选药物，剂量为 $10 \sim 20\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ ，每日2次，饭前服用，共1日。2. 硫双二氯酚(别丁) 剂量为 $50\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ ，每晚一次顿服，1~2日为一疗程。3. 呋喃丙胺剂量为 $40 \sim 60\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 最大量不超过2g，分为3~4次口服，2日为一疗程。4. 槟榔煎剂6岁以下每次服30~40g，6岁以上每次服50g. 槟榔加水煎至100~150ml，清晨一次空腹服下。服后2~4小时如无便意，可服50%硫酸镁导泻。新鲜槟榔效果尤

佳。【预防】（一）开展卫生宣教，提倡对水生植物要熟食。（二）彻底治疗患者。（三）搞好粪便管理。（四）消灭扁卷螺。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com