

小儿结核感染_儿科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E5_B0_8F_E5_84_BF_E7_BB_93_E6_c22_609153.htm 结核菌素试验阳性

“ ”，而找不到具体结核病灶者称为结核感染。【诊断】（一）临床表现1．体弱易患呼吸道感染。2．无或有结核中毒症状（见原发性肺结核）3．浅表淋巴结轻度肿大数目增多。4．少数患儿有结核过敏症状（见原发性肺结核。（二）结核菌素(ot或ppd)试验结果红肿硬结 10mm,，可以除外接种卡介苗引起的反应。（三）x?线检查无异常发现（四）实验室检查1．血象 年长儿可有轻度贫血。2．血沉不快。3．血清抗结核菌纯蛋白衍生物球蛋白(ppd - igg)阳性。【治疗】（一）inh 5 ~ 10mg/(kg?d)，最大量不超过300mg/d，清晨空腹一次性顿服，疗程6个月，必要时可延长至9—12个月。（二）一般疗法同原发性肺结核【预防】同原发性肺结核。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com